

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА імені О. М. БЕКЕТОВА

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

до самостійної роботи, проведення практичних занять
і виконання розрахунково-графічної роботи

з дисципліни

«ЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ»

*(для студентів 2 курсу денної та заочної форм навчання
освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр
за напрямом підготовки 6.030601 «Менеджмент»)*

Харків
ХНУМГ
2013

Методичні вказівки до самостійної роботи, проведення практичних занять і виконання розрахунково-графічної роботи з дисципліни «Економіко-математичне моделювання» (для студентів 2 курсу денної та заочної форм навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр за напрямом підготовки 6.030601 «Менеджмент») / Харк. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова; уклад.: О. М. Штельма, Г. В. Білогурова, С. В. Дядюн. – Х.: ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2013. – 87 с.

Укладачі: О. М. Штельма,
Г. В. Білогурова,
С. В. Дядюн

Методичні вказівки побудовано відповідно до вимог кредитно-модульної системи організації навчального процесу.

Рецензент: к. ф.-м. наук, доцент О. Б. Костенко

Рекомендовано кафедрою прикладної математики та інформаційних технологій,
протокол № 1 від 30.08.2012 р.

Оптимізаційні економіко-математичні моделі

Побудова математичних моделей економічних задач

У загальному вигляді математична постановка екстремальної задачі полягає у визначенні найбільшого (максимального) або найменшого (мінімального) значення цільової функції $Y(x_1, x_2, \dots, x_n) = Y(\bar{x})$ за умов $f_i(x_1, x_2, \dots, x_n) \leq b_i$ ($i = \overline{1, m}$) де Y і f_i – задані функції, а b_i – дійсні числа

$$Y(\bar{x}) \rightarrow \underset{\bar{x} \in \Omega}{opt} \quad \Omega: \begin{cases} f_i(\bar{x}) \leq b_i, \\ f_i(\bar{x}) = b_i, \\ f_i(\bar{x}) \geq b_i, \\ (i = \overline{1, m}) \end{cases}$$

Для побудови математичної моделі задачі необхідно:

- Визначити *невідомі*;
- Скласти *цільову функцію* $Y(\bar{x})$;
- Записати *систему обмежень* Ω .

Побудуємо математичні моделі задач лінійного й нелінійного програмування.

Задача організації виробництва

Для виготовлення трьох видів виробів A, B, C використовується токарне, фрезерне, зварювальне і шліфувальне обладнання. Витрати часу на обробку одного виробу на фрезерному обладнанні складають для виробу $A - 3, B - 6, C - 5$ верстато-год відповідно; на токарному обладнанні для виробу $A - 2, B - 7, C - 3$ верстато-год; на зварювальному обладнанні для виробу $A - 6, B - 5, C - 7$ верстато-год; на шлифовальному обладнанні для виробу $A - 5, B - 8, C - 6$ верстато-год. Загальний фонд робочого часу фрезерного обладнання складе 130 од, токарного, – 220 од, зварювального, – 210 од, шліфувального, – 260 од. Прибуток від реалізації одного виробу A складе 9 грн, $B - 12$ грн, $C - 11$ грн.

Потрібно визначити, скільки виробів і якого виду слід виготовити підприємству, щоб прибуток від їх реалізації був максимальний. Всі дані відображені в табл.1.

Таблиця 1.1

Тип обладнання	Витрати часу на обробку одного виробу, станко-г			Загальний фонд робочого часу обладнання, г
	A	B	C	
Фрезерне	3	6	5	130
Токарне	2	7	3	220
Зварювальне	6	5	7	210
Шліфувальне	5	8	6	260
Прибуток, грн.	9	12	11	–

Побудова математичної моделі задачі

Дана змістовна постановка задача організації виробництва. Це задача лінійного програмування. Для складання математичної моделі задачі необхідно:

1. Визначити *невідомі* – x_1, x_2, x_3 . Буде виготовлено x_1 одиниць виробів виду A , x_2 – виду B та x_3 – виду C .
2. Скласти цільову *функцію* $Y(\bar{x})$. Якщо буде виготовлено x_1 одиниць виробів виду A , x_2 – виду B і x_3 – виду C , то прибуток складе

$$Y(x_1, x_2, x_3) = 9x_1 + 12x_2 + 11x_3 \rightarrow \max_{x \in \Omega}$$

3. Записати систему обмежень Ω . Для виробництва такої кількості виробів потрібно буде витратити $3x_1 + 6x_2 + 5x_3$ станко-г. фрезерного обладнання. Оскільки загальний фонд робочого часу верстатів даного типу не може перевищувати 130, повинна виконуватися нерівність $3x_1 + 6x_2 + 5x_3 \leq 130$.

Аналогічні міркування щодо можливого використання токарного, зварювального і шліфувального обладнання приведуть до наступних нерівностей:

$$2x_1 + 7x_2 + 3x_3 \leq 220;$$

$$6x_1 + 5x_2 + 7x_3 \leq 210;$$

$$5x_1 + 8x_2 + 6x_3 \leq 260.$$

При цьому кількість виробів, що виготовляються, не може бути негативною:
 $x_1 \geq 0; \quad x_2 \geq 0; \quad x_3 \geq 0$

Таким чином, математична постановка задачі має вигляд

$$Y(x_1, x_2, x_3) = 9x_1 + 12x_2 + 11x_3 \rightarrow \max_{x \in \Omega}$$

$$\Omega: \begin{cases} f_1(\bar{x}) = 3x_1 + 6x_2 + 5x_3 \leq 130 \\ f_2(\bar{x}) = 2x_1 + 7x_2 + 3x_3 \leq 220 \\ f_3(\bar{x}) = 6x_1 + 5x_2 + 7x_3 \leq 210 \\ f_4(\bar{x}) = 5x_1 + 8x_2 + 6x_3 \leq 260 \\ x_1, x_2, x_3 \geq 0. \end{cases}$$

Задача планування випуску продукції

На швейній фабриці тканина може бути розкроєна чотирма способами A, B, C, D для виготовлення виробів двох видів. У табл.2. наведені кількості виробів i -го виду ($i = 1, 2$) і величина відходів при j -му Варіанті ($j = 1, 2, 3, 4$) розкрою 1 м^2 . У ній же вказані необхідні кількості кожного виду виробів, які необхідно виготовити фабриці в плановому періоді. Потрібно розкроїти тканину так, щоб було отримано задану кількість виробів кожного виду при мінімальних загальних відходах.

Таблиця 2

Вид виробу	Кількість виробів з 1 м^2 тканини				Планова кількість виробів (м^2)
	A	B	C	D	
I	1	3	4	2	380
II	4	3	1	3	210
Величина відходів	0,1	0,3	0,2	0,4	

Побудова математичної моделі задачі

Дана змістовна постановка задачі планування випуску продукції. Це задача лінійного програмування. Для складання математичної моделі задачі необхідно:

1. Визначити *невідомі*. Позначимо через x_j кількість тканини (m^2), яка

розкрюється по j -му Варіанту $j = \overline{1,4}$. $\bar{x} = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{bmatrix}$.

2. Скласти цільову *функцію* $Y(\bar{x})$. $Y(\bar{x}) = 0,1x_1 + 0,3x_2 + 0,2x_3 + 0,4x_4 \rightarrow \min_{\bar{x} \in \Omega}$.

3. Записати систему обмежень Ω . При цьому кількості виробів обох видів повинні відповідати плану:

$$f_1(\bar{x}) = x_1 + 3x_2 + 4x_3 + 2x_4 = 380;$$

$$f_2(\bar{x}) = 4x_1 + 3x_2 + x_3 + 3x_4 = 210.$$

Кількість тканини x_j , що розкроїли кожним способом, є позитивною величиною, тобто

$$x_j \geq 0 \quad j = \overline{1,4}$$

Таким чином, математична постановка задачі має вигляд:

$$Y(\bar{x}) = 0,1x_1 + 0,3x_2 + 0,2x_3 + 0,4x_4 \rightarrow \min_{\bar{x} \in \Omega}$$

$$\Omega: \begin{cases} f_1(\bar{x}) = x_1 + 3x_2 + 4x_3 + 2x_4 = 380 \\ f_2(\bar{x}) = 4x_1 + 3x_2 + x_3 + 3x_4 = 210 \\ x_1 \geq 0; \quad x_2 \geq 0; \quad x_3 \geq 0; \quad x_4 \geq 0. \end{cases}$$

Транспортна задача планування перевезень

Чотири підприємства даного економічного району для виробництва продукції використовують три види сировини. Потреби в сировині кожного з підприємств відповідно дорівнюють 110, 70, 180 і 120 од. Сировина зосереджена в трьох місцях її отримання, а запаси відповідно дорівнюють 100, 130, 160 од. На кожне з підприємств сировина може завозитися з будь-якого пункту її отримання. Тарифи

перевезень є відомими величинами і задаються матрицею $C = \begin{bmatrix} 5 & 6 & 3 & 4 \\ 3 & 4 & 8 & 5 \\ 5 & 3 & 2 & 5 \end{bmatrix}$. Скласти

такий план перевезень, при якому загальна вартість є мінімальною.

Побудова математичної моделі задачі

Дана змістовна постановка транспортної задачі. Це задача лінійного програмування. Для складання математичної моделі задачі необхідно:

1. Визначити *невідомі*. У транспортній задачі вектор змінних перетвориться до матричного вигляду, причому x_{ij} означає кількість сировини, що перевозиться з i -го місця отримання до j -го підприємства:

$$x = \begin{bmatrix} x_{11} & x_{12} & x_{13} & x_{14} \\ x_{21} & x_{22} & x_{23} & x_{24} \\ x_{31} & x_{32} & x_{33} & x_{34} \end{bmatrix}$$

2. Скласти цільову функцію $Y(\bar{x})$. (Загальна вартість перевезень є мінімальною):

$$Y(\bar{x}) = \sum_i \sum_j c_{ij} x_{ij} \rightarrow \min_{x \in \Omega}$$

$$Y(\bar{x}) = 5x_{11} + 6x_{12} + 3x_{13} + 4x_{14} + 3x_{21} + 4x_{22} + 8x_{23} + 5x_{24} + 5x_{31} + 3x_{32} + 2x_{33} + 5x_{34} \rightarrow \min_{x_{ij} \in \Omega}$$

3. Записати систему обмежень Ω . Запаси сировини відповідно дорівнюють 100, 130, 160 од. Сумарні перевезення сировини з i -го пункту відправлення повинні відповідати загальному їх запасу на даному пункті:

$$f_1(\bar{x}) = \sum_j x_{1j} = x_{11} + x_{12} + x_{13} + x_{14} \leq 100,$$

$$f_2(\bar{x}) = \sum_j x_{2j} = x_{21} + x_{22} + x_{23} + x_{24} \leq 130,$$

$$f_3(\bar{x}) = \sum_j x_{3j} = x_{31} + x_{32} + x_{33} + x_{34} \leq 160.$$

Потреби в сировині кожного з підприємств відповідно дорівнюють 110, 70, 180, 120 од. Сумарний об'єм сировини, що перевозиться в j -й пункт призначення, повинен відповідати потребі:

$$f_4(\bar{x}) = \sum_i x_{i1} = x_{11} + x_{21} + x_{31} = 110,$$

$$f_5(\bar{x}) = \sum_i x_{i2} = x_{12} + x_{22} + x_{32} = 70,$$

$$f_6(\bar{x}) = \sum_i x_{i3} = x_{13} + x_{23} + x_{33} = 180,$$

$$f_7(\bar{x}) = \sum_i x_{i4} = x_{14} + x_{24} + x_{34} = 120.$$

Природно, кількість сировини x_{ij} є величина позитивна, тобто

$$x_{ij} \geq 0 \quad i = \overline{1,3}, j = \overline{1,4}.$$

Таким чином, математична постановка задачі має вигляд:

$$Y(\bar{x}) = 5x_{11} + 6x_{12} + 3x_{13} + 4x_{14} + 3x_{21} + 4x_{22} + 8x_{23} + 5x_{24} + 5x_{31} + 3x_{32} + 2x_{33} + 5x_{34} \rightarrow \min_{x_{ij} \in \Omega}$$

$$\begin{cases} f_1(\bar{x}) = x_{21} + x_{22} + x_{23} + x_{24} \leq 130 \\ f_2(\bar{x}) = x_{11} + x_{12} + x_{13} + x_{14} \leq 100 \\ f_3(\bar{x}) = x_{31} + x_{32} + x_{33} + x_{34} \leq 160 \\ f_4(\bar{x}) = x_{11} + x_{21} + x_{31} = 110 \\ f_5(\bar{x}) = x_{12} + x_{22} + x_{32} = 70 \\ f_6(\bar{x}) = x_{13} + x_{23} + x_{33} = 180 \\ f_7(\bar{x}) = x_{14} + x_{24} + x_{34} = 120 \\ x_{ij} \geq 0, i = \overline{1,3}, j = \overline{1,4}. \end{cases}$$

Лінійне програмування

Математична постановка задачі лінійного програмування

Форми запису задачі лінійного програмування

Загальна задача лінійного програмування формулюється таким чином: знайти оптимум лінійної цільової функції $y(\bar{x})$, якщо обмеження f_i лінійні і змінні \bar{x} позитивні. Аналітичний запис цієї задачі має вигляд:

$$y(\bar{x}) = \bar{c}^T \bar{x} + c_0 \rightarrow \underset{\bar{x} \in \Pi \subset \mathbf{R}^n}{\text{opt}}, \quad (2.1)$$

$$\Omega: \begin{cases} A_1 \bar{x} + \bar{b}_1 \leq 0; \\ A_2 \bar{x} + \bar{b}_2 = 0; \\ A_3 \bar{x} + \bar{b}_3 \geq 0; \\ \bar{x} \geq 0, \end{cases} \quad (2.2)$$

Задачу, подану вище, називають *стандартною* задачею лінійного програмування (ЗЛП).

ЗЛП, в якій обмеження записані у вигляді рівностей і змінні позитивні, називається ЗЛП в *канонічній* формі. *Канонічна*, або *основна* задача лінійного програмування має вигляд

$$y(\bar{x}) = \bar{c}^T \bar{x} + c_0 \rightarrow \underset{\bar{x} \in \Pi \subset \mathbf{R}^n}{\text{opt}}, \quad (2.3)$$

$$\Omega: \begin{cases} A\bar{x} = \bar{b}; \\ \bar{x} \geq 0, \end{cases} \quad (2.4)$$

де A – матриця коефіцієнтів розмірності $m \times n$, $m < n$; \bar{b} – вектор вільних членів обмежень розмірності $m \times 1$.

Перетворення стандартної ЗЛП до канонічної ЗЛП розглянемо на прикладах.

Приклад 1. Перетворити в канонічну форму наступну задачу лінійного програмування:

$$y(x) = x_1 + 4x_2 - 2x_3 \rightarrow \min_{x_j \in \Omega \subset \mathbf{R}^5}$$

$$\Omega: \begin{cases} x_1 - x_3 + x_5 \leq 3 \\ x_1 + x_4 - 5x_5 \geq 8 \\ x_j \geq 0, \quad j = \overline{1,5} \end{cases}$$

Розв'язання

1. Обмеження-нерівність типу " \leq " можна перетворити в обмеження-рівність додаванням до його лівої частини додаткової позитивної змінної, наприклад, $\{x_1 - x_3 + x_5 \leq 3\}$ стане $\{x_1 - x_3 + x_5 + x_6 = 3\}$;

2. Обмеження-нерівність типу " \geq " перетвориться в обмеження-рівність відніманням з його лівої частини додаткової позитивної змінної, наприклад $\{x_1 + x_4 - 5x_5 \geq 8\}$ стане $\{x_1 + x_4 - 5x_5 - x_7 = 8\}$.

Канонічний вигляд початкової задачі:

$$y(x) = x_1 + 4x_2 - 2x_3 \rightarrow \min_{x_j \in \Omega \subset \mathbf{R}^5}$$

$$\Omega: \begin{cases} x_1 - x_3 + x_5 + x_6 = 3 \\ x_1 + x_4 - 5x_5 - x_7 = 8 \\ x_j \geq 0, \quad j = \overline{1, 7} \end{cases}$$

Приклад 2. Перетворити в канонічну форму і записати у векторно-матричній формі наступну задачу лінійного програмування:

$$y(x) = 6x_1 - 4x_2 - 7x_4 + x_5 \rightarrow \min_{x_j \in \Pi \subset \mathbf{R}^5},$$

$$\Pi: \begin{cases} 2x_1 + 5x_3 - 3x_4 + 7x_5 \leq 8; \\ 9x_1 - x_3 + 2x_5 \leq 5; \\ x_2 + x_3 - 3x_4 + 5x_5 \geq 3; \\ x_j \geq 0, \quad j = \overline{1, 5} \end{cases}$$

Розв'язання

1. Нерівності типу " \leq " (f_1, f_2) перетворимо в рівність шляхом додавання до їх лівих частин двох додаткових змінних x_6, x_7 . Отримаємо

$$f_1 = 2x_1 + 5x_3 - 3x_4 + 7x_5 + x_6 = 8; \quad \Delta_1 < 0.$$

2. Нерівність типу " \geq " (f_3) перетворимо в рівність шляхом віднімання з його лівої частини додаткової змінної x_8 . Отримаємо $f_3 = x_2 + x_3 - 3x_4 + 5x_5 - x_8 = 3$.

Канонічний вигляд початкової задачі:

$$y(x) = 6x_1 - 4x_2 - 7x_4 + x_5 \rightarrow \min_{x_j \in \Pi \subset \mathbf{R}^8}$$

$$\Pi: \begin{cases} 2x_1 + 5x_3 - 3x_4 + 7x_5 + x_6 = 8; \\ 9x_1 - x_3 + 2x_5 + x_7 = 5; \\ x_2 + x_3 - 3x_4 + 5x_5 - x_8 = 3; \\ x_j \geq 0, \quad j = \overline{1, 8} \end{cases}$$

Векторно-матрична форма запису початкової задачі:

$$y(x) = [6 \quad -4 \quad 0 \quad -7 \quad 1 \quad 0 \quad 0 \quad 0] \bar{x} \rightarrow \min_{\bar{x} \in \Omega}$$

$$\Pi: \begin{cases} \begin{bmatrix} 2 & 0 & 5 & -3 & 7 & 1 & 0 & 0 \\ 9 & 0 & -1 & 0 & 2 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & -3 & 5 & 0 & 0 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \\ x_5 \\ x_6 \\ x_7 \\ x_8 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 8 \\ 5 \\ 3 \end{bmatrix}; \\ \bar{x} \geq 0. \end{cases}$$

Елементи лінійної алгебри

У розв'язанні задач лінійного програмування симплекс-методом та за допомогою диференційного алгоритму ми будемо застосовувати жорданові виключення.

Проілюструємо жорданові виключення на прикладах обернення матриць і розв'язанні системи лінійних рівнянь.

Приклад 3. Знайти матрицю A^{-1} , обернену матриці

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 0 & 3 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \end{bmatrix},$$

і переконатися у рівності $A \cdot A^{-1} = E$; де E -одинична матриця.

Розв'язання

Матриця A має обернену матрицю тільки в тому випадку, якщо матриця A неособлива, тобто її визначник ΔA не дорівнює нулю. Визначник матриці вимірності 3×3 обчислити за формулою

$$\Delta A = a_{11}a_{22}a_{33} + a_{21}a_{32}a_{13} + a_{31}a_{12}a_{23} - a_{31}a_{22}a_{13} - a_{11}a_{32}a_{23} - a_{21}a_{12}a_{33}$$

Переконаємось, що матриця A має повернену :

$$\Delta A = 2 \cdot 3 \cdot 1 + 0 \cdot 0 \cdot 0 + 1 \cdot 1 \cdot 1 - 1 \cdot 3 \cdot 0 - 2 \cdot 0 \cdot 1 - 0 \cdot 1 \cdot 1 = 7 \neq 0.$$

Для одержання матриці A^{-1} необхідно зробити три кроки жорданових виключень. Для одержання елементів нової таблиці на кожному кроці жорданових виключень будемо користуватися такими співвідношеннями:

для головного елемента
$$b_{kr} = \frac{1}{a_{kr}}; \quad (2.5)$$

для елементів напрямного рядка (крім головного)
$$b_{kj} = \frac{a_{kj}}{a_{kr}}; \quad (2.6)$$

для елементів напрямного стовпця (крім головного)
$$b_{ir} = \frac{a_{ir}}{a_{kr}}; \quad (2.7)$$

для решти елементів
$$b_{ij} = a_{ij} - \frac{a_{ir}a_{kj}}{a_{kr}}; \quad (2.8)$$

Побудуємо вихідну таблицю жорданових виключень:

	t_1	t_2	t_3
$S_1 =$	2	1	0
$S_2 =$	0	3	1
$S_3 =$	1	0	1

Головним елементом на першому кроці буде елемент a_{11} , на другому - a_{22} , на третьому - a_{33} . Визначимо елементи нової таблиці першого кроку:

головний елемент згідно з (2.5)
$$b_{11} = \frac{1}{a_{11}} = \frac{1}{2};$$

елементи напрямного рядка згідно з (2.6) $b_{12} = -\frac{a_{12}}{a_{11}} = -\frac{1}{2}$; $b_{13} = -\frac{a_{13}}{a_{11}} = \frac{0}{2} = 0$;

елементи напрямного стовпця згідно з (2.7)

$$b_{21} = \frac{a_{21}}{a_{11}} = \frac{0}{2} = 0; \quad b_{31} = \frac{a_{31}}{a_{11}} = \frac{1}{2};$$

решта елементів згідно з (2.8)

$$b_{22} = a_{22} - \frac{a_{21}a_{12}}{a_{11}} = 3 - \frac{0 \cdot 1}{2} = 3; \quad b_{23} = a_{23} - \frac{a_{21}a_{13}}{a_{11}} = 1 - \frac{0 \cdot 0}{2} = 1;$$

$$b_{32} = a_{32} - \frac{a_{31}a_{12}}{a_{11}} = 0 - \frac{1 \cdot 1}{2} = -\frac{1}{2}; \quad b_{33} = a_{33} - \frac{a_{31}a_{13}}{a_{11}} = 1 - \frac{1 \cdot 0}{2} = 1.$$

Нова таблиця має вигляд: (1-й крок)

	S_1	t_2	t_3
$t_1 =$	1/2	-1/2	0
$S_2 =$	0	3	1
$S_3 =$	1/2	-1/2	1

Процедури наступних кроків жорданових виключень аналогічні процедурі першого кроку.

	S_1	S_2	t_3		S_1	S_2	S_3	
$t_1 =$	1/2	-1/6	1/6	$t_1 =$	3/7	-1/7	1/7	
$t_2 =$	0	1/3	-1/3	$t_2 =$	1/7	2/7	-2/7	$= A^{-1}$
$S_3 =$	1/2	-1/6	7/6	$t_3 =$	-3/7	1/7	6/7	

2-й крок

3-й крок

Перевіримо тотожність $A \cdot A^{-1} = E$.

$$A \cdot A^{-1} = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 0 & 3 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 3/7 & -1/7 & 1/7 \\ 1/7 & 2/7 & -2/7 \\ -3/7 & 1/7 & 6/7 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} = E.$$

Висновок: матриця A^{-1} визначена вірно.

Приклад 4. Розв'язати систему лінійних рівнянь

$$\begin{cases} x_1 - x_2 + x_4 - 1 = 0; \\ x_2 - 2x_3 + 1 = 0; \\ 2x_1 + x_3 - x_4 + 2 = 0. \end{cases}$$

відносно змінних x_1, x_2, x_4 . Перевірити правильність рішення при $x_3 = 1$.

Розв'язання. Для вирішення системи використаємо жорданові виключення. Вихідна таблиця має вигляд:

	x_1	x_2	x_3	x_4	1
0 =	1	-1	0	1	-1
0 =	0	1	-2	0	1
0 =	2	0	1	-1	2

Елементи останнього стовпця таблиці відповідають вільним членам заданих рівнянь, решта елементів - коефіцієнтам біля відповідних змінних.

Для вирішення системи рівнянь необхідно змінні x_1, x_2, x_4 зробити залежними від змінної x_3 , тобто у таблиці обміняти місцями нулі і змінні x_1, x_2, x_4 . Дана процедура потребує виконання 3-х кроків жорданових виключень з використанням формул (1)-(4).

1-й крок

	0	x_2	x_3	x_4	1
$x_1 =$	1	1	0	-1	1
0 =	0	1	-2	0	1
0 =	2	2	1	-3	4

Перший стовпець у новій системі рівнянь дає тільки нульові члени, тому він може бути вилючений без будь-яких небажаних наслідків. Далі нульові стовпці взагалі записувати не будемо.

2- крок

	x_3	x_4	1
$x_1 =$	2	-1	0
$x_2 =$	2	0	-1
0 =	5	-3*	2

3-крок

	x_3	1
$x_1 =$	1/3	-2/3
$x_2 =$	2	-1
$x_4 =$	5/3	2/3

Розв'язок: $x_1 = \frac{1}{3}x_3 - \frac{2}{3}$; $x_2 = 2x_3 - 1$; $x_4 = \frac{5}{3}x_3 + \frac{2}{3}$. (5)

Перевірка: при $x_3 = 1$ з (5) $x_1 = -1/3$; $x_2 = 1$; $x_4 = 7/3$. Здобуті значення змінних треба підставити до вихідної системи:

$$\begin{cases} -1/3 - 1 + 7/3 - 1 = 0; \\ 1 - 2 \cdot 1 + 1 = 0; \\ 2 \cdot (-1/3) + 1 - 7/3 + 2 = 0. \end{cases}$$

Система рівнянь перетворилася у тотожність. Отже, рішення (5) знайдено вірно.

Розв'язання ЗЛП графічним методом в Excel

Приклад 5. Цех підприємства робить два види продукції (Продукт 1 і Продукт 2). Слід розрахувати оптимальні тижневі обсяги виробництва цих продуктів з точки зору максимізації прибутку. Прибуток (цільова функція Y) від виробництва одиниці Продукту 1 складає 5 грн., а від виробництва одиниці Продукту 2 складає 5,5 грн. На виробництві діють обмеження по сировині, трудовим ресурсам і транспортним витратам :

1. Для виготовлення однієї одиниці Продукту 1 потрібно 3 од. сировини, а для виготовлення однієї одиниці Продукту 2 потрібно 6 од. сировини. Всього цех має 18 од. сировини.
2. Для виготовлення однієї одиниці Продукту 1 потрібно 6 робітників, а для виготовлення однієї одиниці Продукту 2 потрібно 4 робітника. Всього в цеху 24 робітника.
3. Транспортні витрати на перевезення Продукту 1 складають 2 одиниці, а Продукту 2 - 1 одиницю. Ці витрати не можуть бути менше 3 одиниць (ціна оренди одного автомобіля мінімальної вантажопідйомності впродовж дня). Вважаємо, що уся денна продукція цеху може бути вивезена на одній вантажівці.
4. Крім того, очевидно, що жодна зі змінних (число одиниць продукції) не може бути менше 0.

Розв'язання

Математична модель задачі матиме вигляд:

$$\begin{aligned} Y(x_1, x_2) &= 5x_1 + 5,5x_2 \rightarrow \max \\ \Omega: &\begin{cases} 3x_1 + 6x_2 \leq 18 \\ 6x_1 + 4x_2 \leq 24 \\ 2x_1 + x_2 \geq 3 \\ x_1 \geq 0 \\ x_2 \geq 0 \end{cases} \end{aligned}$$

Розв'яжемо задачу графічним методом.

1. Створимо в Excel допоміжну таблицю A9 : F9(див. нижче).
Зафіксуємо змінну(наприклад x_1 - стовпець A). З кожного рівняння обмеження виразимо змінну x_2 :

$$\begin{aligned} x_2 &= \frac{18-3x_1}{6} \text{ з обмеження по сировині;} \\ x_2 &= \frac{24-6x_1}{4} \text{ з обмеження по праці;} \\ x_2 &= 2 - 2x_1 \text{ з обмеження по транспортним витратах} \end{aligned}$$

2. З цільової функції також виразимо змінну x_2

$$x_2 = \frac{\text{const} - 5x_1}{5,5};$$

3. Заповнимо відповідними формулами стовпці B, C, D

В2 fx =ЕСЛИ(18-3*A2>=0;(18-3*A2)/6;#Н/Д)

Оптимизация.xlsx

	A	B	C	D	E	F
1	X1	3X1+6X2<=18	6X1+4X2<=24	2X1+X2>=2	Y	Max
2	0	3	6	2	4,5455	25
3	1	2,5	4,5	0	3,6364	
4	2	2	3	#Н/Д	2,7273	
5	3	1,5	1,5	#Н/Д	1,8182	
6	4	1	0	#Н/Д	0,9091	
7	5	0,5	#Н/Д	#Н/Д	0	
8	6	0	#Н/Д	#Н/Д	-0,909	
9	7	#Н/Д	#Н/Д	#Н/Д	-1,818	
10						

Лист1 Диаграмма1 Лист2

(значення #Н/Д записуємо для того, щоб не виводити на графіці негативні значення змінних)

4. У осередок F2 введемо константу, наприклад 25(змінюючи значення в осередку F2, ми зможемо переміщати цільову функцію);

5. Заповнимо стовпець E

E2 fx =(\$F\$2-5*A2)/5,5

Оптимизация.xlsx


	A	B	C	D	E	F
1	X1	3X1+6X2<=18	6X1+4X2<=24	2X1+X2>=2	Y	Max
2	0	3	6	2	4,5455	25
3	1	2,5	4,5	0	3,6364	
4	2	2	3	#Н/Д	2,7273	
5	3	1,5	1,5	#Н/Д	1,8182	
6	4	1	0	#Н/Д	0,9091	
7	5	0,5	#Н/Д	#Н/Д	0	
8	6	0	#Н/Д	#Н/Д	-0,909	
9	7	#Н/Д	#Н/Д	#Н/Д	-1,818	
10						

Лист1 Диаграмма1 Лист2

6. На окремому листі будуємо діаграму, на якій визначаємо область Ω і обводимо її полилинией;

7. Спостерігаючи за зміною цільової функції, знаходимо точку максимуму(мінімуму) і позначаємо її крапкою;

8. Визначаємо прямі, перетин яких дає оптимальне рішення(обмеження по сировині і обмеження по праці);



9. За допомогою пошуку рішення вирішуємо систему з двох лінійних рівнянь(обмеження по сировині і обмеження по праці);

C11 $f_x = 3*B11+6*B12$

	A	B	C	D	E
9	7	#Н/Д	#Н/Д	#Н/Д	-1,818
10					
11	x1	0	0	18	
12	x2	0	0	24	
13	y	0			

B13 $f_x = 5*B11+5,5*B12$

	A	B	C	D	E
9	7	#Н/Д	#Н/Д	#Н/Д	-1,818
10					
11	x1	0	0	18	
12	x2	0	0	24	
13	y	0			

С11 $=3*B11+6*B12$

Оптимизация.xlsx

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	X1	$3X1+6X2 \leq 18$	$6X1+4X2 \leq 24$	$2X1+X2 \geq 2$	Y	Max				
2	0	3	6	2	4,5455	25				
3	1	2,5	4,5	0	3,6364					
4	2	2	3	#Н/Д	2,7273					
5	3	1,5	1,5	#Н/Д	1,8182					
6	4	1	0	#Н/Д	0,9091					
7	5	0,5	#Н/Д	#Н/Д	0					
8	6	0	#Н/Д	#Н/Д	-0,909					
9	7	#Н/Д	#Н/Д	#Н/Д	-1,818					
10										
11	x1	0	0	18						
12	x2	0	0	24						
13	y	0								
14										
15										
16										

Поиск решения

Установить целевую ячейку:

Равной: ☐ максимальному значению ☒ значению: ☐ минимальному значению

Изменяя ячейки:

Ограничения:

1. Запишемо відповідь: $\bar{x}^* = \begin{bmatrix} 3 \\ 1,5 \end{bmatrix}, y^* = 23,25$.

Оптимизация.xlsx

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	X1	$3X1+6X2 \leq 18$	$6X1+4X2 \leq 24$	$2X1+X2 \geq 2$	Y	Max				
2	0	3	6	2	4,5455	25				
3	1	2,5	4,5	0	3,6364					
4	2	2	3	#Н/Д	2,7273					
5	3	1,5	1,5	#Н/Д	1,8182					
6	4	1	0	#Н/Д	0,9091					
7	5	0,5	#Н/Д	#Н/Д	0					
8	6	0	#Н/Д	#Н/Д	-0,909					
9	7	#Н/Д	#Н/Д	#Н/Д	-1,818					
10										
11	x1	3	18	18						
12	x2	1,5	24	24						
13	y	23,25								
14										
15										
16										

Результаты поиска решения

Решение найдено. Все ограничения и условия оптимальности выполнены.

☒ Сохранить найденное решение ☐ Восстановить исходные значения

Застосування симплекс-методу в економічних задачах

Розглянемо застосування симплекс методу в економічних задачах на конкретних прикладах.

Приклад 6. Підприємство має наступні виробничі ресурси (сировина, обладнання, електроенергія) і може організувати виробництво продукції двома різними способами. Витрати ресурсів і амортизація обладнання за один місяць і загальний ресурс при кожному способі задані в табл.2.1 (у грош.од).

При першому способі виробництва підприємство випускає за один місяць 3 тис. виробів, при другому - 4 тис. виробів.

Таблиця 2.1

Виробничий ресурс	Витрати ресурсів за 1 місяць при роботі		Загальний ресурс
	по 1 способу	по 2 способу	
Сировина	1	2	4
Обладнання	1	1	3
Електроенергія	2	1	8

Скільки місяців повинно працювати підприємство кожним з цих способів, щоб при наявних ресурсах забезпечити максимальний випуск продукції ?

Розв'язання. Позначимо:

x_1 - час роботи підприємства першим способом;

x_2 - час роботи підприємства другим способом.

Математична модель задачі матиме вигляд:

$$y(\bar{x}) = 3x_1 + 4x_2 \rightarrow \max_{x \in \Omega}$$

$$\Omega: \begin{cases} x_1 + 2x_2 \leq 4 \\ x_1 + x_2 \leq 3 \\ 2x_1 + x_2 \leq 8 \\ x_j \geq 0, j = 1, 2 \end{cases}$$

Необхідно привести задачу до канонічної форми :

$$y(\bar{x}) = 3x_1 + 4x_2 \rightarrow \max_{x \in \Omega}$$

$$\Omega: \begin{cases} x_1 + 2x_2 + x_3 = 4 \\ x_1 + x_2 + x_4 = 3 \\ 2x_1 + x_2 + x_5 = 8 \\ x_j \geq 0, j = 1, 5 \end{cases}$$

Як базис виберемо змінні x_3, x_4, x_5 . Далі заповнюємо симплекс-таблицю:

Базис	\bar{C}	\bar{b}	$C_1 = 3$	$C_2 = 4$	$C_3 = 0$	$C_4 = 0$	$C_5 = 0$	θ
			x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	
x_3	0	4	1	2	1	0	0	$4/2$
x_4	0	3	1	1	0	1	0	$3/1$
x_5	0	8	2	1	0	0	1	$8/1$
Δ_j		$\Delta_0 = 0$	-3	-4	0	0	0	

1. Визначаємо початкове опорне рішення. Тобто незалежні змінні дорівнюють 0, а базисні (залежні) змінні дорівнюють правим частинам обмежень задачі. Знаходимо значення цільової функції на даному опорному плані

$$\Delta_0 = \sum_{i=1}^m C_i^{\text{баз}} \cdot b_i = 0 \cdot 4 + 0 \cdot 3 + 0 \cdot 8 = 0$$

Визначаємо оцінки цільової функції $\Delta_j = \sum_{i=1}^m C_i^{baz} \cdot a_{ij} - C_j$

$$\Delta_1 = 0 \cdot 1 + 0 \cdot 1 + 0 \cdot 2 - 3 = -3; \Delta_2 = 0 \cdot 2 + 0 \cdot 1 + 0 \cdot 1 - 4 = -4; \Delta_3 = 0 \cdot 1 + 0 \cdot 0 + 0 \cdot 0 - 0 = 0;$$

$$\Delta_4 = 0 \cdot 0 + 0 \cdot 1 + 0 \cdot 0 - 0 = 0; \Delta_5 = 0 \cdot 0 + 0 \cdot 0 + 0 \cdot 1 - 0 = 0;$$

Перше опорне рішення не є оптимальним, оскільки $\Delta_j < 0, j = \overline{1,5}$.

Критерій оптимальності: мінімум цільової функції досягнутий, якщо для деякого опорного рішення $\bar{x}_{on} = (x_1 \ x_2 \ \dots \ x_{n+m})$ всі оцінки $\Delta_j \leq 0 \ (j = \overline{1, n+m})$, а максимум цільової функції досягнутий, якщо для деякого опорного рішення $\bar{x}_{on} = (x_1 \ x_2 \ \dots \ x_{n+m})$ всі оцінки $\Delta_j \geq 0 \ (j = \overline{1, n+m})$.

2. Виберемо *направляючий стовпець*. Оскільки дана задача на максимум, то для поліпшення рішення серед оцінок Δ_j потрібно вибрати найменшу, в даному випадку $\Delta_2 = -4$. Виділяємо направляючий стовпець. У базис необхідно ввести змінну x_2 .

3. Знайдемо *направляючий рядок*. Для цього підрахуємо симплекс-відношення $\theta_i = \frac{b_i}{a_{ir}}$.

Вибираємо другий рядок $k=2$, оскільки $\theta_k = \min\{4/2; 3/1; 8/1\} = 2$. Виділяємо направляючий рядок сірим кольором, а змінну x_3 необхідно вивести з базису.

4. Заповнюємо симплекс таблицю 2-го шагу. У стовпець “Базис” замість змінної x_3 , яку вивели з базису, вказуємо x_2 , яку ввели в базис.

У стовпець \bar{C}^{baz} вносимо зміни – навпроти x_2 записуємо значення коефіцієнта цільової функції $C_2 = 4$.

Далі симплекс-таблицю заповнюємо в наступному порядку:

1. У стовпцях x_2, x_4, x_5 , відповідаючих базисним змінним, записуємо

одичні вектори $\begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}$.

2. Всі елементи направляючого рядка (окрім \bar{C}^{baz}) ділимо на головний елемент (на 2).

3. Елементи таблиці, що залишилися, перераховуємо за формулою жорданових виключень (за четвертим правилом) $a_{ij}^{noe} = a_{ij} - \frac{a_{ir} \cdot a_{kj}}{a_{kr}}$. Отримана таблиця має

наступний вигляд.

Базис	\bar{C}^{baz}	\bar{b}	$C_1 = 3$	$C_2 = 4$	$C_3 = 0$	$C_4 = 0$	$C_5 = 0$	θ
			x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	
x_2	4	2	1/2	1	1/2	0	0	4
x_4	0	1	1/2	0	-1/2	1	0	2
x_5	0	6	3/2	0	-1/2	0	1	4
Δ_j		$\Delta_0 = 8$	-1	0	2	0	0	

1. Друге опорне рішення $\bar{x}' = (0 \ 2 \ 0 \ 1 \ 6)$ не є оптимальним оскільки $\Delta_1 < 0$.
2. Виберемо *направляючий стовпець*. Оскільки серед всіх Δ_j тільки $\Delta_1 < 0$ направляючим стовпцем буде перший стовпець, а змінну x_1 необхідно ввести в базис.
3. Знайдемо *направляючий рядок*. Для цього підрахуємо симплекс-відношення θ_i . Вибираємо другий рядок $k=2$, оскільки $\theta_k = \min\{4; 2; 4\} = 2$. Направляючий рядок виділяємо сірим кольором, а змінну x_4 необхідно вивести з базису.
4. Заповнюємо симплекс таблицю 3-го кроку.

Базис	$\bar{C}^{баз}$	\bar{b}	$C_1 = 3$	$C_2 = 4$	$C_3 = 0$	$C_4 = 0$	$C_5 = 0$	θ
			x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	
x_2	4	1	0	1	1	-1	0	
x_1	3	2	1	0	-1	2	0	
x_5	0	3	0	0	1	-3	1	
Δ_j		$\Delta_0 = 10$	0	0	1	2	0	

Оскільки всі $\Delta_j \geq 0$, то отримане опорне рішення є оптимальним $\bar{x}^* = (2 \ 1 \ 0 \ 0 \ 3)$, а максимум функції рівний $y(\bar{x}^*) = 10$.

Максимальний випуск продукції складе 10 тис. од., при цьому за першим способом підприємство повинне працювати два місяці, за другим - один місяць.

Розв'язання ЗЛП диференціальним алгоритмом і за допомогою засобу

«Пошук рішення» MS Excel

Приклад 7. Цех підприємства робить два види продукції (Продукт 1 і Продукт 2). Слід розрахувати оптимальні тижневі обсяги виробництва цих продуктів з точки зору максимізації прибутку. Прибуток (цільова функція Y) від виробництва одиниці Продукту 1 складає 5 грн., а від виробництва одиниці Продукту 2 складає 5,5 грн. На виробництві діють обмеження по сировині, трудовим ресурсам і транспортним витратам:

1. Для виготовлення однієї одиниці Продукту 1 потрібно 3 од. сировини, а для виготовлення однієї одиниці Продукту 2 потрібно 6 од. сировини. Всього цех має 18 од. сировини.
2. Для виготовлення однієї одиниці Продукту 1 потрібно 6 робітників, а для виготовлення однієї одиниці Продукту 2 потрібно 4 робітника. Всього в цеху 24 робітника.
3. Транспортні витрати на перевезення Продукту 1 складають 2 одиниці, а Продукту 2 - 1 одиницю. Ці витрати не можуть бути менше 3 одиниць (ціна оренди одного автомобіля мінімальної вантажопідйомності впродовж дня). Вважаємо, що уся денна продукція цеху може бути вивезена на одній вантажівці.
4. Крім того, очевидно, що жодна зі змінних (число одиниць продукції) не може бути менше 0.

Розв'язання. Математична модель задачі матиме вигляд:

$$Y(x_1, x_2) = 5x_1 + 5,5x_2 \rightarrow \max$$

$$\Omega: \begin{cases} 3x_1 + 6x_2 \leq 18 \\ 6x_1 + 4x_2 \leq 24 \\ 2x_1 + x_2 \geq 2 \\ x_1 \geq 0 \\ x_2 \geq 0 \end{cases}$$

Розв'яжемо задачу за допомогою диференційного алгоритму.

1. Необхідно привести задачу до канонічної форми. Задачу максимізації зведемо до задачі мінімізації.

$$Y(x_1, x_2) = -5x_1 - 5,5x_2 + 0x_3 + 0x_4 + 0x_5 \rightarrow \min$$

$$\Omega: \begin{cases} 3x_1 + 6x_2 + x_3 = 18 \\ 6x_1 + 4x_2 + x_4 = 24 \\ 2x_1 + x_2 - x_5 = 2 \\ x_j \geq 0 \quad (j = \overline{1,5}) \end{cases}$$

2. Виразимо залежні змінні x_3 , x_4 і x_5 через незалежні x_1 і x_2 . Рішення представимо у вигляді таблицки.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	1 Поиск опорного решения									
2										
3		x1	x2	1			0			
4	x3=	-3	-6	18	3		0			
5	x4=	-6	-4	24	6	Хоп=	18	не является допустимым		
6	x5=	2	1	-2	2		24			
7	y=	-5	-5,5	0			-2			
8										
9	2 Поиск опорного допустимого решения									
10										
11		x1	x5	1			0			
12	x3=	9	-6	6	1		2			
13	x4=	2	-4	16	4	Хоп, доп=	6	не является оптимальным		
14	x2=	-2	1	2	-		16			
15	y=	6	-5,5	-11			0			
16										
17	3 Поиск оптимального решения									
18										
19		x1	x3	1			0			
20	x5=	1,50	-0,17	1,00			3			
21	x4=	-4,00	0,67	12,00	3	Хоп, доп=	0	не является оптимальным		
22	x2=	-0,50	-0,17	3,00	6		12			
23	y=	-2,25	0,92	-16,50			1			
24										
25	3 Поиск оптимального решения									
26										
27		x4	x3	1			3			
28	x5=	-0,38	0,08	5,50			1,5			
29	x1=	-0,25	0,17	3,00		x*=	0	y=23,25		
30	x2=	0,13	-0,25	1,50			0			
31	y=	0,56	0,54	-23,25			5,5			
32										

Розв'яжемо задачу за допомогою засобу «Пошук рішення»

1. Створити екранну форму

	A	B	C	D	E	F	G
1			ПЕРЕМЕННЫЕ				
2		Имя	X1	X2			
3		Значение					
4		Нижняя гран	0	0	ЦФ		
5					Значение ЦФ		
6		Коэф ЦФ	5	5,5	0	max	
7							
8			ОГРАНИЧЕНИЯ				
9	№	Вид ресурса	Продукт 1	Продукт 2	Вычислен- ные значения	Знак	Заданные ограничения
10	1	Сырье	3	6	0	<=	18
11	2	Труд	6	4	0	<=	24
12	3	Транспорт	2	1	0	>=	2

2. За допомогою функції СУММАПРОИЗВ(Массив1; Массив2;) вичислити «значення ЦФ»(=СУММПРОИЗВ(C3: D3;C6: D6)) і «Вичислені значення обмежень».
3. Встановити курсор в осередок Е6, викликати «Пошук рішення» і заповнивши його таким чином, натиснути «Виконати»
- 4.

fx =СУММПРОИЗВ(C3:D3;C6:D6)

	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
	ПЕРЕМЕННЫЕ									
	X1	X2								
дан	0	0	ЦФ							
			Значение ЦФ							
	5	5,5	0	max						
	ОГРАНИЧЕНИЯ									
урса	Продукт 1	Продукт 2	Вычислен- ные значения	Знак	Заданн ограниче					
	3	6	0	<=	18					
	6	4	0	<=	24					
рт	2	1	0	>=	2					

Поиск решения

Установить целевую ячейку:

Равной: ☒ максимальному значению ☐ значению: 0

☐ минимальному значению

Изменяя ячейки:

Ограничения:

- \$E\$10 <= \$G\$10
- \$E\$11 <= \$G\$11
- \$E\$12 >= \$G\$12

Доб...
Изме...
Уда...

		fx		=СУММПРОИЗВ(С3:Д3;С6:Д6)		
	A	B	C	D	E	F
1			ПЕРЕМЕННЫЕ			
2		Имя	X1	X2		
3		Значение	3	1,5		
4		Нижняя гран	0	0	ЦФ	
5					Значение ЦФ	
6		Козф ЦФ	5	5,5	23,25	max
7						
8			ОГРАНИЧЕНИЯ			
9	№	Вид ресурса	Продукт 1	Продукт 2	Вычислен-ные значения	Заданные ограничения
10	1	Сырье	3	6	18	<= 18
11	2	Труд	6	4	24	<= 24
12	3	Транспорт	2	1	7,5	>= 2

Результаты поиска решения

Решение найдено. Все ограничения и условия оптимальности выполнены.

Тип отчета
 Результаты
 Устойчивость
 Пределы

☒ Сохранить найденное решение
☐ Восстановить исходные значения

OK Отмена Сохранить сценарий... Справка

5. Отримане рішення співпадає з рішеннями, отриманими іншими методами.
 За допомогою пошуку рішення легко знайти і цілочисельне рішення задачі, якщо ввести додаткові обмеження

Добавление ограничения

Ссылка на ячейку: \$D\$3

Ограничение: целое

OK Отмена Добавить Справка

Цілочисельне рішення має наступний вигляд

		fx		=СУММПРОИЗВ(С3:Д3;С6:Д6)		
	A	B	C	D	E	F
1			ПЕРЕМЕННЫЕ			
2		Имя	X1	X2		
3		Значение	2	2		
4		Нижняя гран	0	0	ЦФ	
5			цел	цел	Значение ЦФ	
6		Козф ЦФ	5	5,5	21	max
7						
8			ОГРАНИЧЕНИЯ			
9	№	Вид ресурса	Продукт 1	Продукт 2	Вычислен-ные значения	Заданные ограничения
10	1	Сырье	3	6	18	<= 18
11	2	Труд	6	4	20	<= 24
12	3	Транспорт	2	1	6	>= 2

Установка параметрів рішення задачі

Задача запускається у вікні "**Пошук рішення**". Але заздалегідь для встановлення конкретних параметрів рішення задач оптимізації певного класу необхідно натиснути кнопку "**Параметри**" і заповнити деякі поля вікна "**Параметри пошуку рішення**"(рис.2.1).

Параметр "**Максимальний час**" служить для призначення часу(у секундах), що виділяється на рішення задачі. У полі можна ввести час, що не перевищує 32 767 секунд(більше 9 годин).

Параметр "**Граничне число ітерацій**" служить для управління часом рішення задачі шляхом обмеження числа проміжних обчислень. У полі можна ввести кількість ітерацій, що не перевищує 32 767.

Параметр "**Відносна погрішність**" служить для завдання точності, з якою визначається відповідність осередку цільовому значенню або наближення до вказаних меж. Поле повинно містити число з інтервалу від 0 до 1. Чим *менше* кількість десяткових знаків у введеному числі, тим нижче точність. Висока точність збільшить час, який потрібно для того, щоб зійшовся процес оптимізації.




Рис.2.1. Параметри пошуку рішення, відповідні для більшості завдань ЛП

Параметр "**Допустиме відхилення**" служить для завдання допуску на відхилення від оптимального рішення в цілочисельних задачах. При вказівці більшого допуску пошук рішення закінчується швидше.

Параметр "**Збіжність**" застосовується тільки при рішенні нелінійних задач. Установка прапорця "**Лінійна модель**" забезпечує прискорення пошуку рішення лінійної задачі за рахунок застосування симплекс-методу.

Підтвердіть встановлені параметри натисненням кнопки "**ОК**".

Транспортна задача

Постановка, методи розв'язання та аналізу

Транспортна задача є однією з найпоширеніших спеціальних задач лінійного програмування. Її мета – розробка найбільш раціональних шляхів і способів транспортування товарів, усунення надмірно дальніх, зустрічних, повторних перевезень. Все це скорочує час просування товарів, зменшує витрати підприємств,

пов'язані із здійсненням процесів забезпечення сировиною, матеріалами, паливом, обладнанням і т.д.

У загальному вигляді транспортну задачу можна подати наступним чином:
у m пунктах виробництва A_1, A_2, \dots, A_m роблять деякий однорідний продукт у кількостях, відповідно, a_1, a_2, \dots, a_m . Цей продукт споживають у n пунктах B_1, \dots, B_n у кількостях, відповідно, b_1, b_2, \dots, b_n . Припустимо, що з кожного пункту виробництва можливе транспортування продукту в будь-який пункт споживання. Транспортні витрати з перевезення з пункту A_i у пункт B_j одиниці продукції рівні c_{ij} ($i = \overline{1, m}; j = \overline{1, n}$).

Задача полягає у визначенні такого плану перевезень, при якому запити всіх споживачів повністю задоволені, весь продукт із пунктів виробництва вивезений і сумарні транспортні витрати мінімальні.

У залежності від співвідношення між сумарним обсягом виробництва (запасами вантажу) і сумарним споживанням, транспортні задачі бувають *закриті* й *відкриті*.

Закрита транспортна задача: Якщо обсяг виробництва дорівнює обсягу споживання, тобто

$$\sum_{i=1}^m a_i = \sum_{j=1}^n b_j,$$

то транспортна задача називається закритою.

Відкрита транспортна задача: Якщо обсяг виробництва не дорівнює обсягу споживання, тобто

$$\sum_{i=1}^m a_i \neq \sum_{j=1}^n b_j$$

то транспортна задача називається відкритою.

Розглянемо *закриту транспортну задачу*. Умови транспортної задачі зручно подати у вигляді :

Пункти виправлення	Запаси	Пункти призначення					
		B_1	B_2	...	B_j	...	n
		Потреби					
		b_1	b_2	...	b_j	...	b_n
A_1	a_1	c_{11} x_{11}	c_{12} x_{12}	...	c_{1j} x_{1j}	...	c_{1n} x_{1n}
A_2	a_2	c_{21} x_{21}	c_{22} x_{22}	...	c_{2j} x_{2j}	...	c_{2n} x_{2n}
...
A_i	a_i	c_{i1} x_{i1}	c_{i2} x_{i2}	...	c_{ij} x_{ij}		c_{in} x_{in}
...
m	a_m	c_{m1} x_{m1}	c_{m2} x_{m2}	...	c_{mj} x_{mj}	...	c_{mn} x_{mn}

Для складання математичної моделі задачі введемо змінні $x_{ij} \geq 0$ ($i = \overline{1, m}; j = \overline{1, n}$), що позначають кількість вантажу, перевезеного з i -го пункту виробництва в j -й пункт споживання.

Математична модель транспортної задачі має вигляд:

$$L(X) = \sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^n c_{ij} x_{ij} \rightarrow \min_{x_{ij} \in \Omega} \quad (2.9)$$

$$\Omega: \begin{cases} \sum_{j=1}^n x_{ij} = a_i, (i = 1, 2, \dots, m;) \\ \sum_{i=1}^m x_{ij} = b_j, (j = 1, 2, \dots, n;) \\ x_{ij} \geq 0; i = \overline{1, m}, j = \overline{1, n}. \end{cases} \quad (2.10)$$

Умови (2.10) гарантують повне вивезення продукту з усіх пунктів виробництва й повне задоволення попиту у всіх пунктах споживання.

Транспортна задача являє собою задачу лінійного програмування із $(m \times n)$ числом змінних x_{ij} , і $(m + n)$ числом обмежень-рівностей.

Змінні x_{ij} нумерують за допомогою двох індексів і тому записують у вигляді

матриці:

$$X = \begin{bmatrix} x_{11} & x_{12} & \dots & x_{1n} \\ x_{21} & x_{22} & \dots & x_{2n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ x_{m1} & x_{m2} & \dots & x_{mn} \end{bmatrix}$$

Матрицю X називають планом перевезень транспортної задачі, а змінні x_{ij} — перевезеннями.

Матриця $C = \| c_{ij} \|$ називається матрицею транспортних витрат.

Оптимальним рішенням задачі є матриця

$$X_{opt} = (x_{ij})_{m \times n},$$

яка задовольняє системі обмежень і надає мінімум цільовій функції. Існують ручні й машинні методи рішення транспортної задачі. До ручних відносяться розподільний метод, метод потенціалів, до машинних — угорський метод, метод диференціальних стрічок.

Розв'язання транспортної задачі за допомогою ручних методів складається з наступних етапів:

- визначення початкового опорного рішення задачі;
- перевірка цього рішення на оптимальність;
- перехід від одного опорного рішення до другого.

Розглянемо рішення транспортної задачі на прикладі.

Приклад 8. Три постачальники A_1, A_2, A_3 мають запаси продукції в кількостях 60, 50, 50 т. відповідно. Споживачі B_1, B_2, B_3, B_4 повинні отримати цю продукцію в кількостях 40, 40, 30, 50 т. відповідно. Знайти такий Варіант прикріплення постачальників до споживачів, при якому сума витрат на

перевезення буде мінімальною. Якщо витрати по перевезенню 1 т. продукції задані матрицею:

$$C = \begin{pmatrix} 3 & 3 & 2 & 2 \\ 3 & 4 & 2 & 4 \\ 2 & 4 & 3 & 4 \end{pmatrix} \text{ (грош.од.)}$$

Розв'язання. Позначимо через x_{ij} – кількість продукції, яку щомісячно слід доставляти на j -й завод з i -го складу. Тоді математична модель задачі має вигляд

$$L(X) = 3x_{11} + 3x_{12} + 2x_{13} + 2x_{14} + 3x_{21} + 4x_{22} + 2x_{23} + 4x_{24} + 2x_{31} + 4x_{32} + \\ + 3x_{33} + 4x_{34} \rightarrow \min_{x_{ij} \in \Omega},$$

$$\Omega: \begin{cases} x_{11} + x_{21} + x_{31} = 40 \\ x_{12} + x_{22} + x_{32} = 40 \\ x_{13} + x_{23} + x_{33} = 30 \\ x_{14} + x_{24} + x_{34} = 50 \\ x_{11} + x_{12} + x_{13} + x_{14} = 60 \\ x_{21} + x_{22} + x_{23} + x_{24} = 50 \\ x_{31} + x_{32} + x_{33} + x_{34} = 50 \\ x_{ij} \geq 0, i = \overline{1,3}, j = \overline{1,4}. \end{cases}$$

1-й крок. 1-й етап. Найбільш поширеним методом побудови вихідного опорного плану є метод північно-західного кута. Він полягає в послідовному розподілі продукції споживачам з урахуванням можливостей постачальників, починаючи з лівого верхнього квадрата (клітинки) й закінчуючи правим нижнім квадратом (клітинкою).

Використовуючи метод північно-західного кута, знайдемо опорне рішення транспортної задачі. Згідно з цим методом заповнюємо таблицю, починаючи з лівого верхнього кута. Порівнюємо запас вантажу в першому пункті відправлення 60 од. з потребою першого пункту призначення 40 од. Вибираємо меншу величину (40) і записуємо її в даний квадрат (табл.2.2). Перший постачальник, маючи 60 од. вантажу, відправляє першому споживачеві 40 од. вантажу. Оскільки першому споживачеві не потрібен більше груз, то з подальшого розгляду виключаємо перший стовпець.

Таблиця 2.2

Пункти відправлення	Запаси	Пункти призначення			
		B_1	B_2	B_3	B_4
		Потреби			
		40	40	30	50
A_1	60	3 40	3	2	2
A_2	50	3	4	2	4
A_3	50	2	4	3	4

Тепер на першому пункті відправлення залишилося $60-40=20$ од. продукції. Порівнюємо залишок 20 од. і потребу 40 од., які перший постачальник поставляє другому споживачеві. Вибираємо меншу величину (20) і записуємо її в сусідню клітинку (табл. 2.2). Оскільки весь запас в першому пункті відправлення вичерпаний, то з подальшого розгляду виключаємо перший рядок і переходимо в сусідню клітинку, яка знаходиться нижче заповненої.

Таблиця 2.3

Пункти відправлення	Запаси	Пункти призначення			
		B_1	B_2	B_3	B_4
		Потреби			
		40	40	30	50
A_1	60	3 40	3 20	2	2
A_2	50	3	4	2	4
A_3	50	2	4	3	4

У новій клітинці другий постачальник залишає 20 од. вантажу для другого споживача і другий стовпець заповнений, оскільки другому споживачеві не потрібен більше вантаж (див табл. 2.4).

Таблиця 2.4

Пункти відправлення	Запаси	Пункти призначення			
		B_1	B_2	B_3	B_4
		Потреби			
		40	40	30	50
A_1	60	3 40	3 20	2	2
A_2	50	3	4 20	2	4
A_3	50	2	4	3	4

Тепер на другому пункті відправлення залишилося $50-20=30$ од. продукції, які другий постачальник віддає третьому споживачеві. Другий рядок і третій стовпець з подальшого розгляду виключаємо, оскільки запаси другого постачальника вичерпані і потреби третього споживача задоволені.

Остання права нижня клітинка заповнюється механічно – в неї записується залишкова потреба останнього пункту призначення або залишковий запас останнього пункту відправлення. В умовах задачі це величина 50. Всі результати із знаходження початкового опорного плану наведені в табл. 2.5. Вони в таблиці виділені жирним шрифтом.

Таблиця 2.5

Пункти відправлення	Запаси	Пункти призначення			
		B_1	B_2	B_3	B_4
		Потреби			
		40	40	30	50
A_1	60	3 40	3 20	2	2 0
A_2	50	3	4 20	2 30	4
A_3	50	2	4	3	4 50

Таким чином, ми одержали перший початковий опорний план.

$$X_0 = \begin{bmatrix} 40 & 20 & 0 & 0 \\ 0 & 20 & 30 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 50 \end{bmatrix}.$$

Обчислюємо значення цільової функції: $L(X) = 3 \cdot 40 + 3 \cdot 20 + 4 \cdot 20 + 2 \cdot 30 + 4 \cdot 50 = 520$.

Це значення буде використано на подальших кроках для контролю просування до оптимуму. Значення цільової функції повинне послідовно зменшуватися з кожним кроком.

Тепер необхідно перевірити умову *невиродженості*. План

$$X = (x_{ij})_{m \times n}, (i = \overline{1, m}; j = \overline{1, n}),$$

є невивродженим, якщо в ньому кількість відмінних від нуля компонентів у точності дорівнює $m + n - 1$, а якщо менше – то вивродженим.

Число зайнятих кліток в таблиці дорівнює 5, $m + n - 1 = 3 + 4 - 1 = 6$, тобто умова *невивродженості* не виконана. Зробимо його невивродженим, помістивши базисні нулі в клітку з координатами $(i, j): (1, 4)$.

2-й етап. Знайдений опорний план перевіряємо на оптимальність методом потенціалів за наступним критерієм: якщо опорне рішення транспортної задачі є оптимальним, то йому відповідає система дійсних чисел $\alpha_i (i = \overline{1, m})$ і $\beta_j (j = \overline{1, n})$ задовольняючих умовам:

$$\beta_j + \alpha_i = c_{ij} \quad \text{при} \quad x_{ij} > 0 \quad (\text{для зайнятих кліток});$$

$$\beta_j + \alpha_i \leq c_{ij} \quad \text{при} \quad x_{ij} = 0 \quad (\text{для вільних кліток}).$$

Числа $\alpha_i (i = \overline{1, m})$ і $\beta_j (j = \overline{1, n})$ називаються *потенціалами* відповідно пунктів відправлення і пунктів призначення. У зв'язку з цим знаходимо потенціали пунктів відправлення і призначення з системи:

$$\beta_1 + \alpha_1 = 3, \quad \beta_2 + \alpha_2 = 4, \quad \beta_4 + \alpha_1 = 2,$$

$$\beta_2 + \alpha_1 = 3, \quad \beta_3 + \alpha_2 = 2, \quad \beta_4 + \alpha_3 = 4,$$

що містить шість рівнянь з сім'ю невідомими. Вважаючи $\alpha_1 = 0$, знаходимо $\beta_1 = 3$, $\alpha_2 = 1$, $\beta_2 = 3$, $\alpha_3 = 2$, $\beta_3 = 1$, $\beta_4 = 2$. Записуємо знайдені потенціали в табл. 5.

3-й етап. Визначимо величину $\Delta_{ij} = \beta_j + \alpha_i - c_{ij}$, яку називають оцінкою вільних кліток. Якщо всі оцінки вільних кліток $\Delta_{ij} \leq 0$, то опорне рішення є оптимальним. Якщо хоч би одна з оцінок $\Delta_{ij} > 0$, то опорне рішення не є оптимальним і необхідно перейти до нового опорного рішення.

Таблиця 2.6

Пункти відправки	Запаси	Пункти призначення				α_i
		B_1	B_2	B_3	B_4	
		Потреби				
		40	40	30	50	
A_1	60	3 - 40	3 20	2	2 +	0
A_2	50	3	4 20	2 30	4	1
A_3	50	2 +	4	3	4 - 50	2
β_j		3	3	1	2	

Для кожної вільної клітки обчислюємо оцінки: $\Delta_{ij} = \beta_j + \alpha_i - c_{ij}$: $\Delta_{13} = -1$, $\Delta_{21} = 1, \Delta_{24} = -1$, $\Delta_{31} = 3$, $\Delta_{32} = 1$, $\Delta_{33} = 0$. Оскільки серед оцінок Δ_{ij} є позитивні, то опорний план X_0 не є оптимальним.

Серед позитивних оцінок вибираємо максимальний тариф: $\Delta_{31} = 3$. Для відповідної вільної клітки будуємо цикл і перерозподіляємо потоки продукції, а саму клітку позначаємо знаком «+». Потім, рухаючись по зайнятих клітках, по черзі відзначаємо їх знаками «-» і «+». При цьому напрям руху може змінюватися тільки під прямим кутом і замикатися на початковій клітці. У результаті побудови циклу у відповідних рядках і стовпцях має бути парна кількість знаків «-», «+». У табл. 2.6 зайняті клітки, складові циклу, виділені сірим фоном.

Потім з вершин зі знаком «-» обирають мінімальний вантаж, його додають до вантажів, що стоять у вершин зі знаком «+», і віднімають від вантажів у вершин із знаком «-». В результаті перерозподілу вантажу отримаємо нове опорне рішення (опорний план).

Найменшим з чисел x_{ij} в «мінусових» клітках є $x_{11} = 40$ (мінімальний вантаж). Ця клітка стає вільною, а решта кліток циклу міняють свої значення таким чином $x_{14} = 0 + 40 = 40$; $x_{31} = 0 + 40 = 40$; $x_{34} = 50 - 40 = 10$;

У результаті виконаних перетворень отримуємо новий опорний план X_1

$$= \begin{bmatrix} 0 & 20 & 0 & 40 \\ 0 & 20 & 30 & 0 \\ 40 & 0 & 0 & 10 \end{bmatrix}.$$

При такому опорному плані цільова функція стає рівною 400,

що менше початкового значення 520.

На цьому закінчується 1-й крок оптимізації. На наступному кроці процедура 1-го кроку повторюється, але без 1-го етапу.

2-й крок. Аналізуємо новий опорний план (див. табл.2.7) на оптимальність. Знову знаходимо потенціали пунктів відправлення і пунктів призначення, для чого складаємо систему рівнянь і вважаючи $\alpha_1 = 0$ вирішуємо її: $\beta_1 = 0, \alpha_2 = 1, \beta_2 = 3, \beta_3 = 1, \beta_4 = 2, \alpha_3 = 2$.

Таблиця 2.7

Пункти відправки	Запаси	Пункти призначення				α_i
		B_1	B_2	B_3	B_4	
		Потреби				
		40	40	30	50	
A_1	60	3	3 20	2	2 40	0
A_2	50	3	4 20	2 30	4	1
A_3	50	2 40	4	3	4 10	2
β_j		0	3	1	20	

Для кожної вільної клітки обчислюємо оцінки: $\Delta_{11} = -3, \Delta_{13} = -1, \Delta_{21} = -2, \Delta_{24} = -1, \Delta_{32} = 1, \Delta_{33} = 0$.

Оскільки серед оцінок $\Delta_{ij} = \beta_j + \alpha_i - c_{ij}$ є позитивна ($\Delta_{32} = 1$), то опорний план X_1 не є оптимальним.

Позитивна оцінка ($\Delta_{32} = 1$) відповідає клітці (3,2). Для відповідної вільної клітки будуємо цикл, а саму клітку позначаємо знаком «+». У табл. 2.8 зайняті клітки, складові циклу, виділені сірим фоном. Потім позначаємо вузлові клітки циклу по черзі знаками «-» і «+».

Таблиця 2.8

Пункти відправ.	Запаси	Пункти призначення				α_i
		B_1	B_2	B_3	B_4	
		Потреби				
		40	40	30	50	
A_1	60	3	3 - 20	2	2 + 40	
A_2	50	3	4 20	2 30	4	
A_3	50	2 40	4 +	3	4 - 10	
β_j						

Найменшим з чисел x_{ij} в «мінусових» клітках є $x_{34} = 10$. Дана клітка стає вільною, а решта кліток циклу міняють свої значення таким чином: $x_{12} = 20 - 10 = 10, x_{14} = 40 + 10 = 50, x_{34} = 0 + 10 = 10$

$$\text{Новий опорний план } X_2 = \begin{bmatrix} 0 & 10 & 0 & 50 \\ 0 & 20 & 30 & 0 \\ 40 & 10 & 0 & 0 \end{bmatrix}. \text{ При такому опорному плані}$$

функція мети стає рівною 390, що менше попереднього значення 400.

3-й крок. Аналізуємо новий опорний план (див. табл.8) на оптимальність. Знову знаходимо потенціали пунктів відправлення і пунктів призначення, для чого складаємо систему рівнянь і вирішуємо її.

$$\begin{aligned} \beta_2 + \alpha_1 &= 3, & \beta_2 + \alpha_2 &= 4, & \beta_1 + \alpha_3 &= 2, \\ \beta_4 + \alpha_1 &= 2, & \beta_3 + \alpha_2 &= 2, & \beta_2 + \alpha_3 &= 4, \end{aligned}$$

Вважаючи $\alpha_1 = 0$, знаходимо $\beta_1 = 1, \beta_2 = 3, \alpha_2 = 1, \beta_3 = 1, \beta_4 = 2, \alpha_3 = 1$. Для кожної вільної клітки обчислюємо оцінки $\Delta_{ij} = \beta_j + \alpha_i - c_{ij}$: $\Delta_{11} = -2, \Delta_{13} = -1, \Delta_{21} = -1, \Delta_{24} = -1, \Delta_{33} = -1, \Delta_{34} = -1$. Оскільки всі оцінки негативні, то опорний план X_2 є оптимальним.

Таблиця 2.9

Пункти відправки	Запаси	Пункти призначення				α_i
		B_1	B_2	B_3	B_4	
		Потреби				
		40	40	30	50	
A_1	60	3	3 10	2	2 50	0
A_2	50	3	4 20	2 30	4	1
A_3	50	2 40	4 10	3	4	1
β_j		1	3	1	2	

$$\text{Таким чином, знайдено оптимальний план } X^* = \begin{bmatrix} 0 & 10 & 0 & 50 \\ 0 & 20 & 30 & 0 \\ 40 & 10 & 0 & 0 \end{bmatrix}.$$

Цільова функція набуває оптимального значення $L(X) = 390$.

Знаходження початкового опорного плану методом мінімальної вартості

Згідно з цим методом вантажі розподіляються насамперед в ті клітки, в яких знаходиться мінімальний тариф перевезень. Далі постачання розподіляються в незайняті клітки з найменшими тарифами з урахуванням запасів, що залишилися у постачальників і задоволення попиту споживачів. Процес розподілу продовжується до тих пір, поки всі вантажі від постачальників не будуть вивезені, а споживачі не будуть задоволені.

Приклад 9. Використовуючи умови **прикладу 1** визначити початковий опорний план методом мінімальної вартості й знайти оптимальне рішення задачі методом потенціалів.

Розв'язання. Всі результати по знаходженню початкового опорного плану методом мінімальної вартості наведені в табл. 2.10

Таблиця 2.10

Пункти відправки	Запаси	Пункти призначення			
		B_1	B_2	B_3	B_4
		Потреби			
		40	40	30	50
A_1	60	3	3	2 30	2 30
A_2	50	3	4 40	2	4 10
A_3	50	2 40	4	3	4 10

Ми одержали перший початковий опорний план.

$$X_0 = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 30 & 30 \\ 0 & 40 & 0 & 10 \\ 40 & 0 & 0 & 10 \end{bmatrix}.$$

Обчислюємо значення цільової функції: $L(X) = 2 \cdot 30 + 2 \cdot 30 + 4 \cdot 40 + 4 \cdot 10 + 2 \cdot 40 + 4 \cdot 10 = 440$.

У наступних таблицях наведено рішення задачі методом *потенціалів*.

Таблиця 2.11

Пункти відправки	Запаси	Пункти призначення				α_i
		B_1	B_2	B_3	B_4	
		Потреби				
		40	40	30	50	
A_1	60	3	3	2 30 -	2 30 +	0
A_2	50	3	4 40	2 +	4 10 -	2
A_3	50	2 40	4	3	4 10	2
β_j		0	2	2	2	

Таблиця 2.12

Пункти відправки	Запаси	Пункти призначення				α_i
		B_1	B_2	B_3	B_4	
		Потреби				
		40	40	30	50	
A_1	60	3	3	2 20 -	2 40 +	0
A_2	50	3	4 40 -	2 10 +	4	0
A_3	50	2 40	4 +	3	4 10 -	2
β_j		0	4	2	2	

$$X_1 = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 20 & 40 \\ 0 & 40 & 10 & 0 \\ 40 & 0 & 0 & 10 \end{bmatrix}. \quad L(X) = 420$$

Таблиця 2.13

Пункти відправки	Запаси	Пункти призначення				α_i
		B_1	B_2	B_3	B_4	
		Потреби				
		40	40	30	50	
A_1	60	3	3 +	2 10 -	2 50	0
A_2	50	3	4 30 -	2 20 +	4	0
A_3	50	2 40	4 10	3	4	0
β_j		2	4	2	2	

$$X_2 = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 20 & 40 \\ 0 & 40 & 10 & 0 \\ 40 & 0 & 0 & 10 \end{bmatrix}. \quad L(X) = 400$$

Таблиця 2.14

Пункти відправки	Запаси	Пункти призначення				α_i
		B_1	B_2	B_3	B_4	
		Потреби				
		40	40	30	50	
A_1	60	3	3 10	2	2 50	0
A_2	50	3	4 20	2 30	4	1
A_3	50	2 40	4 10	3	4	1
β_j		1	3	1	2	

Таким чином, знайдено оптимальний план $X^* = \begin{bmatrix} 0 & 10 & 0 & 50 \\ 0 & 20 & 30 & 0 \\ 40 & 10 & 0 & 0 \end{bmatrix}.$

Цільова функція набуває оптимального значення $L(X) = 390$

Рішення транспортної задачі за допомогою засобу «Пошук рішення» MS Excel

Приклад 10. На чотирьох складах деякий штучний товар є в наступних кількостях: на першому 25 штук, на другому 50 штук, на третьому 35 штук і на четвертому 75 шт. Цей товар має бути доставлений в три магазини в наступних кількостях: в перший 45 штук, в другий 90 штук і в третій 50 штук. Вартість перевезення одиниці товару з i -го складу в j -й магазин задана матрицею

$$\begin{pmatrix} 2 & 9 & 7 \\ 1 & 0 & 5 \\ 5 & 4 & 100 \\ 2 & 3 & 6 \end{pmatrix}$$

Необхідно знайти найбільш дешевий план перевезень, що

повністю задовольняє потреби магазинів в товарі.

Розв'язання. Математична модель задачі має вигляд :

$$Y(X) = 2x_{11} + 9x_{12} + 7x_{13} + x_{21} + 5x_{23} + 5x_{31} + 4x_{32} + 100x_{33} + 2x_{41} + 3x_{42} + 6x_{43} \rightarrow \min$$

$$\Omega: \begin{cases} x_{11} + x_{12} + x_{13} = 25 \\ x_{21} + x_{22} + x_{23} = 50 \\ x_{31} + x_{32} + x_{33} = 35 \\ x_{41} + x_{42} + x_{43} = 75 \\ x_{11} + x_{21} + x_{31} + x_{41} = 45 \\ x_{12} + x_{22} + x_{32} + x_{42} = 90 \\ x_{13} + x_{23} + x_{33} + x_{43} = 50 \\ \forall x_{ij} \geq 0, (i = \overline{1,4}; j = \overline{1,3}) \\ \forall x_{ij} - \text{целые} \end{cases}$$


де x_{ij} кількість товару, що перевозиться з i -го складу в j -й магазин.

Розв'яжемо задачу за допомогою засобу «Пошук рішення»

1. Створити екранну форму

Microsoft Excel - Пример_2.xls								
Файл Правка Вид Вставка Формат Сервис Данные Окно ?								
F15		=СУММПРОИЗВ(С3:Е6;С12:Е15)						
	A	B	C	D	E	F	G	H
1		ПЕРЕМЕННЫЕ				ОГРАНИЧЕНИЯ		
2		целые	x1	x2	x3	Лев. часть	Знак	Прав. часть
3		x1j				0	=	25
4		x2j				0	=	50
5		x3j				0	=	35
6		x4j				0	=	75
7	ОГРАНИЧЕНИЯ	Лев. часть	0	0	0			
8		Знак	=	=	=			185
9		Прав. часть	45	90	50			185 БАЛАНС
10								
11		ТАРИФЫ	x1	x2	x3			
12		x1j	2	9	7			
13		x2j	1	0	5			
14		x3j	5	4	100	ЦФ	Значение	Направление
15		x4j	2	3	6		0	min
16								

2. За допомогою функції СУММАПРОИЗВ(Массив1; Массив2;...) вичислити «значення ЦФ»(=СУММПРОИЗВ(C3: E6;C12: E15)) і «Вичислені значення обмежень».
3. Встановити курсор в осередок E15, викликати «Пошук рішення» і заповнивши його таким чином, натиснути « Виконати»



4. Порівняйте рішення, отримане вручну, з рішенням в Excel.

Microsoft Excel - Пример_2.xls

Файл Правка Вид Вставка Формат Сервис Данные Окно ?

F15 = =СУММПРОИЗВ(C3:E6;C12:E15)

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1		ПЕРЕМЕННЫЕ				ОГРАНИЧЕНИЯ			
2		целые	xi1	xi2	xi3	Лев. часть	Знак	Прав. часть	
3		x1j	25	0	0	25	=	25	
4		x2j	0	50	0	50	=	50	
5		x3j	0	35	0	35	=	35	
6		x4j	20	5	50	75	=	75	
7	ОГРАНИЧЕНИЯ	Лев. часть	45	90	50				
8		Знак	=	=	=			185	
9		Прав. часть	45	90	50			185	БАЛАНС
10									
11		ТАРИФЫ	xi1	xi2	xi3				
12		x1j	2	9	7				
13		x2j	1	0	5				
14		x3j	5	4	100	ЦФ	Значение	Направление	
15		x4j	2	3	6		545	min	
16									

Лист1 / Лист2 / Лист3 / Лист4 / Лист5 / Лист6 / Лист7 / Лис

Двоїстість у лінійному програмуванні

Кожній задачі лінійного програмування можна певним чином поставити у відповідність іншу задачу лінійного програмування, яку називають **двоїстою** по відношенню до даної (початкової) задачі. Початкова і двоїста задачі тісно зв'язані між собою і утворюють *єдину пару* двоїстих задач, причому задача, двоїста по відношенню до двоїстої задачі, збігається з початковою.

Залежно від структури моделі вихідної задачі розрізняють симетричні, несиметричні та змішані двоїсті задачі.

Симетричні двоїсті задачі.

Симетрична пара двоїстих задач.

Початкова задача	Двоїста задача
$y(\bar{x}) = \sum_{j=1}^n c_j x_j \rightarrow \max$ $\begin{cases} \sum_{j=1}^n a_{ij} x_j \leq b_i, i = \overline{1, m}; \\ x_j \geq 0, j = \overline{1, n}. \end{cases}$	$d(\bar{z}) = \sum_{i=1}^m b_i z_i \rightarrow \min$ $\begin{cases} \sum_{i=1}^m a_{ji} z_i \geq c_j, j = \overline{1, n}; \\ z_i \geq 0, i = \overline{1, m}. \end{cases}$

Порівнюючи форми запису прямої та двоїстої задач, можна встановити між ними наступні взаємозв'язки.

- Кожному i -му обмеженню вихідної задачі відповідає змінна z_i двоїстої задачі й, навпаки, кожному j -му обмеженню двоїстої задачі відповідає змінна x_j вихідної задачі.
- Вільні члени обмежень однієї із задач є коефіцієнтами при відповідних змінних у цільовій функції іншої задачі. При цьому максимізація міняється на мінімізацію, і навпаки.
- Матриці систем обмежень двоїстої пари задач взаємно транспоновані. Отже, рядок коефіцієнтів a_{ij} в j -м обмеженні двоїстої задачі є стовпець коефіцієнтів при x_j в обмеженнях вихідної задачі й навпаки. Знаки нерівностей змінюються на протилежні. Вільними членами обмежень є коефіцієнти при відповідних змінних у цільовій функції задачі.
- Всі змінні двоїстої задачі позитивні.

Несиметричні двоїсті задачі

Несиметрична пара двоїстих задач

Початкова задача	Двоїста задача
<ol style="list-style-type: none"> $y(\bar{x}) = \sum_{j=1}^n c_j x_j \rightarrow \max$ $\sum_{j=1}^n a_{ij} x_j = b_i, \quad i = \overline{1, m};$ $x_j \geq 0, \quad j = \overline{1, n}.$ 	<ol style="list-style-type: none"> $d(\bar{z}) = \sum_{i=1}^m b_i z_i \rightarrow \min$ $\sum_{i=1}^m a_{ji} z_i \geq c_j, \quad j = \overline{1, n};$ z_i – довільні по знаку, $i = \overline{1, m};$

Взаємозв'язки між прямою та двоїстою задачами такі ж самі, як в парі симетричних задач, але треба врахувати наступні особливості:

- Обмеженнями двоїстої задачі будуть нерівності. У задачах обмеження-нерівності варто записувати зі знаком " \leq " при максимізації та зі знаком " \geq " при мінімізації.
- Змінні z_i довільні по знаку, тобто можуть набувати як позитивних, так і негативних значень.

Змішані двоїсті задачі

Математична модель вихідної задачі має умови симетричних та несиметричних задач. Якщо необхідно побудувати двоїсту задачу, треба виконувати правила симетричних і несиметричних задач.

Розберемо декілька прикладів побудови двоїстих задач.

Приклад 11. Побудувати двоїсту задачу до заданої:

$$y(\bar{x}) = 2x_1 - 2x_2 + x_3 \rightarrow \max_{\bar{x} \in \Omega}$$

$$\Omega: \begin{cases} x_1 - 2x_2 + x_3 \leq 7 & z_1 \\ 2x_1 + 3x_2 - 2x_3 \leq 10 & z_2 \\ x_1 \geq 0, x_2 \geq 0, x_3 \geq 0 \end{cases}.$$

Розв'язання. Необхідно ввести змінні z_1, z_2 і записати відповідно до вказаних правил двоїсту задачу:

$$d(\bar{z}) = 7z_1 + 10z_2 \rightarrow \min_{\bar{z} \in \Omega}$$

$$\Omega: \begin{cases} z_1 + 2z_2 \geq 2 \\ -2z_1 + 3z_2 \geq -2 \\ z_1 - 2z_2 \geq 1 \\ z_1 \geq 0, z_2 \geq 0 \end{cases}$$

Дана задача є симетричною.

Приклад 12. Побудувати двоїсту задачу до заданої :

$$y(\bar{x}) = 3x_1 + x_2 + 3x_3 + x_4 \rightarrow \min_{\bar{x} \in \Omega}$$

$$\Omega: \begin{cases} 2x_1 - 2x_2 + 3x_3 - x_4 = 9 & z_1 \\ x_1 + x_2 - 6x_3 - x_4 = 6 & z_2 \\ x_j \geq 0, j = 1, 4 \end{cases}$$

Розв'язання. Необхідно ввести змінні z_1, z_2 і записати відповідно до вказаних правил двоїсту задачу:

$$d(\bar{z}) = 9z_1 + 6z_2 \rightarrow \max_{\bar{z} \in \Omega}$$

$$\Omega: \begin{cases} 2z_1 + z_2 \leq 3 \\ -2z_1 + z_2 \leq 1 \\ 3z_1 - 6z_2 \leq 3 \\ -z_1 - z_2 \leq 1 \end{cases}$$

z_i — довільні по знаку, $i = 1, 2$;

Дана задача є несиметричною.

Приклад 13. Побудувати двоїсту задачу до заданої :

$$y(\bar{x}) = x_1 - 2x_2 + x_3 - x_4 + x_5 \rightarrow \min_{\bar{x} \in \Omega}$$

$$\Omega: \begin{cases} x_1 - 2x_2 + x_3 + 3x_4 - 2x_5 = 6 & z_1 \\ 2x_1 + 3x_2 - 2x_3 - x_4 + x_5 \leq 4 & z_2 \\ x_1 + 3x_3 - 4x_5 \geq 8 & z_3 \\ x_1 \geq 0, x_2 \geq 0, x_3 \geq 0 \end{cases}$$

Розв'язання. Перш ніж приступити до побудови двоїстої задачі, необхідно упорядкувати запис початкової задачі. Оскільки цільова функція мінімізується, то нерівності мають бути записані у вигляді " \geq ". Для цього другу нерівність помножимо на -1, після чого вона запишеться у вигляді

$$-2x_1 - 3x_2 + 2x_3 + x_4 - x_5 \geq -4$$

Необхідно ввести змінні z_1, z_2 і записати відповідно до вказаних правил двоїсту задачу:

$$d(\bar{z}) = 6z_1 - 4z_2 + 8z_3 \rightarrow \max_{\bar{z} \in \Omega}$$

$$\Omega: \begin{cases} z_1 - 2z_2 + z_3 \leq 1 \\ -2z_1 - 3z_2 = -2 \\ z_1 + 2z_2 + 3z_3 \leq 1 \\ 3z_1 + z_2 = -1 \\ -2z_1 - z_2 - 4z_3 \leq 1 \\ z_2 \geq 0, z_3 \geq 0 \end{cases}$$

Друге і четверте обмеження виражені у вигляді рівностей, оскільки відповідні їм змінні x_2 та x_4 не підпорядковані умовам позитивності. Умови позитивності в двоїстій задачі накладені тільки на змінні z_2 та z_3 , оскільки їм відповідають в початковій задачі обмеження у вигляді нерівностей.

Дана задача є змішаною.

Приклад 14. Побудувати двоїсту задачу до заданої :

$$y(\bar{x}) = x_1 + 4x_2 + 3x_3 + 2x_4 \rightarrow \max_{\bar{x} \in \Omega}$$

$$\Omega: \begin{cases} 3x_1 + x_2 + 2x_3 + x_4 = 12 & z_1 \\ 2x_1 + 2x_2 - x_3 + 2x_4 \leq 11 & z_2 \\ 4x_1 + x_2 + 3x_3 - x_4 \geq 9 & z_3 \\ x_1 \geq 0, x_2 \geq 0, x_3 \geq 0 \end{cases}$$

Розв'язання. Оскільки початкова задача на максимум, то третю нерівність потрібно привести до вигляду « \leq », для чого помножимо її на "-1", отримаємо: $-4x_1 - x_2 - 3x_3 + x_4 \leq -9$.

Необхідно ввести змінні z_1, z_2, z_3 та записати відповідно до вказаних правил двоїсту задачу:

$$d(\bar{z}) = 12z_1 + 11z_2 - 9z_3 \rightarrow \min_{\bar{z} \in \Omega}$$

$$\Omega: \begin{cases} 3z_1 + 2z_2 - 4z_3 \geq 1; \\ z_1 + 2z_2 - z_3 = 4; \\ 2z_1 - z_2 - 3z_3 \geq 3; \\ z_1 + 2z_2 + z_3 \geq 2; \\ z_2 \geq 0, \quad z_3 \geq 0. \end{cases}$$

Друге обмеження двоїстої задачі записане у вигляді рівності, оскільки відповідна йому змінна x_2 в початковій задачі може бути будь-якою. На змінну z_1 не накладається обмеження позитивності, оскільки відповідно їй перше обмеження в початковій задачі має вид строгої рівності.

Дана задача є змішаною.

Застосування теорії двоїстості в економіці

Приклад 15. Фірма випускає три види виробів, маючи в своєму розпорядженні сировину чотирьох типів А, Б, В, Г, відповідно, в кількостях 18, 16, 8 і 6 т. Норми витрат кожного типу сировини на 1 од. виробу першого виду складають, відповідно, 1, 2, 1, 0, другого виду 2, 1, 1, 1 і третього виду - 1, 1, 0, 1. Прибуток від реалізації 1 од. виробу першого виду 3 грош.од., другого - 4 грош.од., третього - 2 грош.од.

1. Скласти план виробництва трьох видів виробів, щоб отримати максимальний прибуток.
2. По вихідним даним задачі сформулювати другу економічну задачу (двоїсту до даної).
3. Знайти оптимальне рішення двоїстої задачі.
4. Визначити дефіцитність сировини.

Розв'язання. Позначимо $\bar{x} = (x_1, x_2, x_3)$ план виробництва виробів трьох видів. Математична модель задачі матиме вигляд:

$$y(\bar{x}) = 3x_1 + 4x_2 + 2x_3 \rightarrow \max_{\bar{x} \in \Omega}$$

$$\Omega: \begin{cases} x_1 + 2x_2 + x_3 \leq 18; \\ 2x_1 + x_2 + x_3 \leq 16; \\ x_1 + x_2 \leq 8; \\ x_2 + x_3 \leq 6; \\ x_1, x_2, x_3 \geq 0 \end{cases}$$

Приведемо задачу до канонічної форми, введемо додаткові змінні x_4, x_5, x_6, x_7 .

$$y(\bar{x}) = 3x_1 + 4x_2 + 2x_3 \rightarrow \max_{\bar{x} \in \Omega}$$

$$\Omega: \begin{cases} x_1 + 2x_2 + x_3 + x_4 = 18; \\ 2x_1 + x_2 + x_3 + x_5 = 16; \\ x_1 + x_2 + x_6 = 8; \\ x_2 + x_3 + x_7 = 6; \\ x_j \geq 0, j = 1, 7 \end{cases}$$

Розв'язуємо задачу симплекс-методом.

Базис	\overline{C}^{baz}	\bar{b}	$C_1 = 3$	$C_2 = 4$	$C_3 = 2$	$C_4 = 0$	$C_5 = 0$	$C_6 = 0$	$C_7 = 0$	θ
			x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6	x_7	
x_4	0	18	1	2	1	1	0	0	0	9
x_5	0	16	2	1	1	0	1	0	0	16
x_6	0	8	1	1	0	0	0	1	0	8
x_7	0	6	0	1	1	0	0	0	1	6
Δ_j		$\Delta_0 = 0$	-3	-4	-2	0	0	0	0	

Наступні таблиці будуть мати вигляд:

Базис	\overline{C}^{baz}	\bar{b}	$C_1 = 3$	$C_2 = 4$	$C_3 = 2$	$C_4 = 0$	$C_5 = 0$	$C_6 = 0$	$C_7 = 0$	θ
			x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6	x_7	
x_4	0	6	1	0	-1	1	0	0	-2	6
x_5	0	10	2	0	0	0	1	0	-1	5
x_6	0	2	1	0	-1	0	0	1	-1	2
x_2	4	6	0	1	1	0	0	0	1	
Δ_j		$\Delta_0 = 24$	-3	0	2	0	0	0	4	

Базис	\overline{C}^{baz}	\bar{b}	$C_1 = 3$	$C_2 = 4$	$C_3 = 2$	$C_4 = 0$	$C_5 = 0$	$C_6 = 0$	$C_7 = 0$	θ
			x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6	x_7	
x_4	0	4	0	0	2	1	0	-1	-1	
x_5	0	6	0	0	-1	0	1	-2	1	3
x_1	3	2	1	0	-1	0	0	1	-1	
x_2	4	6	0	1	1	1	0	0	1	4
Δ_j		$\Delta_0 = 30$	0	0	-1	0	0	3	4	

Базис	\bar{C}	\bar{b}	$C_1 = 3$	$C_2 = 4$	$C_3 = 2$	$C_4 = 0$	$C_5 = 0$	$C_6 = 0$	$C_7 = 0$	θ
			x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6	x_7	
x_4	0	4	0	0	0	1	0	-1	-1	
x_3	2	3	0	0	1	0	$\frac{1}{2}$	-1	$\frac{1}{2}$	
x_1	3	5	1	0	0	0	$\frac{1}{2}$	0	$-\frac{1}{2}$	
x_2	4	3	0	1	0	0	$-\frac{1}{2}$	1	$\frac{1}{2}$	
Δ_j		$\Delta_0 = 33$	0	0	0	0	$\frac{1}{2}$	2	$\frac{3}{2}$	

Оскільки всі $\Delta_j \geq 0$, то отримане опорне рішення є оптимальним $\bar{x}^* = (5 \ 3 \ 3 \ 4 \ 0 \ 0 \ 0)$, а максимум функції рівний $y(\bar{x}^*) = 33$.

Оптимальний план виробництва трьох видів виробів: 5 виробів I виду, 3 – II виду, 3 – III виду, максимальний прибуток складе 33 грош. од.

1. Сформулюємо двоїсту задачу до даної:

$$d(\bar{z}) = 18z_1 + 16z_2 + 8z_3 + 6z_4 \rightarrow \min_{\bar{z} \in \Omega}$$

$$\Omega: \begin{cases} z_1 + 2z_2 + z_3 \geq 3 \\ 2z_1 + z_2 + z_3 + z_4 \geq 4 \\ z_1 + z_2 + z_4 \geq 2 \\ z_i \geq 0, i = \overline{1,4}; \end{cases}$$

У двоїстій задачі треба знайти оптимальні ціни z_1, z_2, z_3, z_4 за сировину і мінімізувати загальну вартість всієї сировини $d(\bar{z}) \rightarrow \min_{\bar{z} \in \Omega}$.

2. Якщо вихідна задача розв'язана симплекс методом, то рішення двоїстої задачі може бути знайдено за допомогою формули

$$\bar{z}' = \bar{c}' A^{-1}$$

де \bar{c}' – вектор-рядок коефіцієнтів при базисних змінних цільової функції в оптимальному рішенні початкової задачі;

A^{-1} – зворотна матриця для матриці A , яка є матрицею коефіцієнтів базисних змінних системи обмежень початкової задачі в оптимальному рішенні.

Базисними змінними в оптимальному рішенні є x_1, x_2, x_3, x_4 .

$$\bar{c}' = [3 \ 4 \ 2 \ 0] \quad A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 & 1 \\ 2 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \end{bmatrix} \quad A^{-1} = \begin{bmatrix} 0 & \frac{1}{2} & 0 & -\frac{1}{2} \\ 0 & -\frac{1}{2} & 1 & \frac{1}{2} \\ 0 & \frac{1}{2} & -1 & \frac{1}{2} \\ 1 & 0 & -1 & -1 \end{bmatrix}$$

$$\bar{z}' = \bar{c}' A^{-1} = [3 \quad 4 \quad 2 \quad 0] \begin{bmatrix} 0 & 1/2 & 0 & -1/2 \\ 0 & -1/2 & 1 & 1/2 \\ 0 & 1/2 & -1 & 1/2 \\ 1 & 0 & -1 & -1 \end{bmatrix} = [0 \quad 1/2 \quad 2 \quad 3/2 \quad 0 \quad 0 \quad 0]$$

Оптимальне рішення $\bar{z}' = [0 \quad 1/2 \quad 2 \quad 3/2 \quad 0 \quad 0 \quad 0]$, а мінімум функції, згідно з теоремою двоїстості $y(x)_{\max} = d(\bar{z})_{\min}$, дорівнює $d(\bar{z}) = 33$.

3. Найбільш дефіцитною є сировина типу В, для якої подвійна оцінка $z_3 = 2$. Менш дефіцитна сировина типу Б, для якої $z_2 = 1/2$. Зовсім недефіцитною є сировина типу А, $z_1 = 0$.

Нелінійні оптимізаційні моделі економічних систем

Безумовна оптимізація

Нелінійність в економіці виникає, коли результати діяльності підприємств зростають або спадають непропорційно зміні масштабів використання ресурсів, наприклад, через насичення ринку товарами, коли кожний наступний товар продати складніше, ніж попередню.

Задачі нелінійної оптимізації можна поділити на два великих класи:

- безумовна оптимізація (областю припустимих рішень є увесь евклідов простір);
- умовна оптимізація (наявність області Ω).

Задачу пошуку безумовного глобального оптимуму можна сформулювати таким чином: знайти оптимум функції $y(\bar{x})$, заданої в n -мірному евклідовому просторі R^n . Аналітичний запис цієї задачі має вигляд:

$$y(\bar{x}) \rightarrow \text{opt}, \quad \bar{x} \in R^n \quad (4.1)$$

Необхідні умови точки локального оптимуму мають вигляд:

$$\left(\frac{\partial y}{\partial \bar{x}} \right)^* = 0. \quad (4.2)$$

Точки, в яких виконуються необхідні умови зветься стаціонарними. Стаціонарна точка може бути як точкою екстремуму, так і точкою перегину.

Для визначення достатніх умов існування локального оптимуму розглянемо матрицю Гесса. H – матриця Гесса, що містить другі похідні функції $y(\bar{x})$:

$$H = \begin{bmatrix} \frac{\partial^2 y}{\partial x_1^2} & \frac{\partial^2 y}{\partial x_1 \partial x_2} & \cdots & \frac{\partial^2 y}{\partial x_1 \partial x_n} \\ \frac{\partial^2 y}{\partial x_2 \partial x_1} & \frac{\partial^2 y}{\partial x_2^2} & \cdots & \frac{\partial^2 y}{\partial x_2 \partial x_n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \frac{\partial^2 y}{\partial x_n \partial x_1} & \frac{\partial^2 y}{\partial x_n \partial x_2} & \cdots & \frac{\partial^2 y}{\partial x_n^2} \end{bmatrix};$$

Достатні умови для точки локального мінімуму полягають у додатній визначеності матриці Гесса H , що обчислена в точці мінімуму.

Зауваження: якщо в деякій точці при виконанні необхідних умов матриця Гесса від'ємно визначена, то ця точка є локальним максимумом.

Класичні й прямі методи оптимізації

Усі методи оптимізації можна поділити на класичні (непрямі, посередні, точні) та розшукові (прямі, безпосередні, наближені, ітераційні).

Класичні методи дозволяють знайти точку оптимуму посереднім шляхом – через розв'язання системи рівнянь. Завдяки цьому отриманий розв'язок є точним, якщо вирішення системи рівнянь здійснювалось не наближеними методами.

Прямими методами вирішують задачу оптимізації шляхом ітераційного наближення до точки мінімуму. Розв'язок отримують наближеним, але із забезпеченням наперед заданої точності. На відміну від класичних існує відносно багато прямих методів.

Метод Ейлера

Метод Ейлера належить до класичних методів. Він базується на необхідних та достатніх умовах точки локального мінімуму.

Приклад 16.

Методом Ейлера знайти мінімум функції

$$y(\bar{x}) = -x_1^3 + 6x_1x_2 + 3x_2^2 + 6x_1 - 18x_2 \rightarrow \min_{\bar{x} \in \mathbb{R}^2}$$

Розв'язання

Задачу розв'язують в три етапи.

- *Перший* – полягає в розв'язанні системи n рівнянь:

$$\frac{\partial y}{\partial x_i} = 0, \quad i = 1, 2, \dots, n,$$

продиктованих необхідними умовами для точки локального мінімуму та знаходженні усіх стаціонарних точок,

- *другий* – у формуванні матриці других часткових похідних для кожної стаціонарної точки;
- *третій* – в перевірці отриманих матриць на додатну визначеність згідно з критерієм Сильвестра та знаходженням точки мінімуму, як цього вимагають достатні умови.

Для визначення характеру квадратичної форми використаємо критерій Сильвестра, який полягає в обчисленні головних визначників матриці квадратичної форми A :

$$\Delta_1 = a_{11}; \quad \Delta_2 = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix}; \quad \Delta = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & a_{nn} \end{vmatrix}.$$

- Якщо всі головні визначники додатні, то квадратична форма додатно визначена;
- якщо всі непарні головні визначники від'ємні, а парні – додатні, то квадратична форма від'ємно визначена.
- у решті випадків – не визначена або напіввизначена.

Перший етап. Для нашого прикладу отримаємо систему рівнянь:

$$\begin{cases} -3x_1^2 + 6x_2 + 6 = 0; \\ 6x_1 + 6x_2 - 18 = 0. \end{cases}$$

Розв'язком системи є стаціонарні точки $\bar{x}_A^{(0)} = \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \end{bmatrix}$; $\bar{x}_B^{(0)} = \begin{bmatrix} -4 \\ 7 \end{bmatrix}$. *Другий етап.*

Визначимо елементи матриць других похідних $H_A^{(0)}$, $H_B^{(0)}$ відповідно в точках $\bar{x}_A^{(0)}$ і $\bar{x}_B^{(0)}$:

в точці $\bar{x}_A^{(0)}$
$$h_{11} = \left(\frac{\partial^2 y}{\partial x_1^2} \right)_A^{(0)} = (-6x_1)_A^{(0)} = -12;$$

в точці $\bar{x}_B^{(0)}$
$$h_{11} = \left(\frac{\partial^2 y}{\partial x_1^2} \right)_B^{(0)} = (-6x_1)_B^{(0)} = 24;$$

$$h_{22} = \left(\frac{\partial^2 y}{\partial x_2^2} \right)_A^{(0)} = \left(\frac{\partial^2 y}{\partial x_2^2} \right)_B^{(0)} = 6;$$

$$h_{12} = h_{21} = \left(\frac{\partial^2 y}{\partial x_1 \partial x_2} \right)^{(0)} = \left(\frac{\partial^2 y}{\partial x_2 \partial x_1} \right)^{(0)} = 6;$$

Складемо матриці $H_A^{(0)} = \begin{bmatrix} -12 & 6 \\ 6 & 6 \end{bmatrix}$; $H_B^{(0)} = \begin{bmatrix} 24 & 6 \\ 6 & 6 \end{bmatrix}$.

Третій етап. Згідно з критерієм Сильвестра матриця $H_A^{(0)}$ не визначена; матриця $H_B^{(0)}$ додатно визначена. Отже, $\bar{x}_B^{(0)}$ - точка локального мінімуму (при від'ємній визначеності матриці других похідних в стаціонарній точці має місце максимум функції).

У точці $\bar{x}^* = \bar{x}_B^{(0)} = \begin{bmatrix} -4 \\ 7 \end{bmatrix}$ задана функція $y^* = -107$, що і потрібно знайти.

Метод покоординатного спуску

Метод покоординатного спуску належить до прямих методів багатовимірної оптимізації.

Приклад 17. Методом покоординатного спуску знайти мінімум функції цілі $y(\bar{x}) = x_1^3 + x_2^3 - 6x_1x_2$ з точністю $\varepsilon = 0.12$, взяти за початкову точку наближення точку $\bar{x}^{(0)} = \begin{bmatrix} 2.4 \\ 2.3 \end{bmatrix}$.

Розв'язання. У методі покоординатного спуску, який ще зветься методом Гаусса-Зейделя, на кожному кроці змінюється тільки одна змінна. Тому рекурентне співвідношення між попередньою точкою наближення до мінімуму і наступною має вигляд

$$x_r^{(k+1)} = x_r^{(k)} + \lambda_r^{(k)} \Delta x_r^{(k)}, \quad (5.3)$$

$$\text{де } \Delta x_r^{(k)} = - \left(\frac{\partial y}{\partial x_r} \right)^{(k)}, \text{ а } \lambda_r^{(k)} = \frac{1}{\left| \left(\frac{\partial^2 y}{\partial x_r^2} \right)^{(k)} \right|}. \quad (5.4)$$

тобто

$$x_r^{(k+1)} = x_r^{(k)} - \frac{\left(\frac{\partial y}{\partial x_r}\right)^{(k)}}{\left|\left(\frac{\partial^2 y}{\partial x_r^2}\right)^{(k)}\right|}. \quad (5.5)$$

Зауважимо, що друга похідна обов'язково повинна братися за модулем, інакше при її від'ємному значенні процес мінімізації піде у зворотному напрямку.

Варіювання змінних здійснюють послідовно: спочатку – першу, потім – другу і т.д. Цикл, що складається з n послідовних кроків, створює одну ітерацію. Пошук мінімуму закінчують, як тільки на черговому кроці абсолютне значення усіх складових вектора перших часткових похідних функції цілі будуть менш, ніж задана точність обчислень

$$\left|\left(\frac{\partial y}{\partial x_i}\right)^{(k)}\right| < \varepsilon, \quad i = \overline{1, n}. \quad (5.6)$$

Нульова ітерація:

$$\text{1-й крок.} \quad \left(\frac{\partial y}{\partial x_1}\right)^{(0)} = 3.48 > \varepsilon; \quad \left(\frac{\partial^2 y}{\partial x_1^2}\right)^{(0)} = 14.4$$

Нове значення змінної $x_1^{(1)}$ визначається відповідно до (5.5):

$$x_1^{(1)} = 2.4 - \frac{3.48}{14.4} = 2.1589.$$

Тепер формується нова проміжна точка $\bar{x}^{(1,0)} = \begin{bmatrix} 2.158 \\ 2.3 \end{bmatrix}$.

2-й крок. Нове значення змінної x_2 визначається також відповідно виразу (5.5). Треба пам'ятати, що до відповідних похідних підставляється нова проміжна точка $\bar{x}^{(1,0)}$.

$$\left(\frac{\partial y}{\partial x_2}\right)^{(1,0)} = 2.92 > \varepsilon; \quad \left(\frac{\partial^2 y}{\partial x_2^2}\right)^{(1,0)} = 13.8; \quad x_2^{(1)} = 2.3 - \frac{2.92}{13.8} = 2.088.$$

У результаті нульової ітерації отримали точку $\bar{x}^{(1)} = \begin{bmatrix} 2.158 \\ 2.088 \end{bmatrix}$.

Необхідно пересвідчитися у наближенні до точки мінімуму в результаті нульової ітерації: $y^{(1)} = -7.882 < -7.129 = y^{(0)}$.

Перевіremo виконання співвідношення (5.6)

$$\left(\frac{\partial y}{\partial x_1}\right)^{(1)} = 1.442 > \varepsilon; \quad \left(\frac{\partial y}{\partial x_2}\right)^{(1)} = 0.131 > \varepsilon;$$

Співвідношення (5.6) не виконується. Тому переходимо до першої ітерації.

Перша ітерація:

$$\text{1-й крок.} \quad \left(\frac{\partial y}{\partial x_1}\right)^{(1)} = 1.442 > \varepsilon; \quad \left(\frac{\partial^2 y}{\partial x_1^2}\right)^{(1)} = 12.948; \quad x_1^{(2)} = 2.158 - \frac{1.442}{12.948} = 2.047;$$

$$\bar{x}^{(2,1)} = \begin{bmatrix} 2.047 \\ 2.088 \end{bmatrix}.$$

$$\text{2-й крок. } \left(\frac{\partial y}{\partial x_2}\right)^{(2,1)} = 0.7972 > \varepsilon; \left(\frac{\partial^2 y}{\partial x_2^2}\right)^{(2,1)} = 12.528; x_2^{(2)} = 2.088 - \frac{0.7972}{12.528} = 2.0243.$$

У результаті першої ітерації отримаємо $\bar{x}^{(2)} = \begin{bmatrix} 2.047 \\ 2.0243 \end{bmatrix}$.

Треба пересвідчитися у наближенні до точки мінімуму в результаті першої ітерації: $y^{(2)} = -7.99004 < -7.882 = y^{(1)}$.

Перевіримо виконання співвідношення (5.6)

$$\left(\frac{\partial y}{\partial x_1}\right)^{(2)} = 0.4248 > \varepsilon; \left(\frac{\partial y}{\partial x_2}\right)^{(2)} = |-0.008| < \varepsilon;$$

Співвідношення (5.6) не виконується по змінній x_1 , переходимо до другої ітерації.

Друга ітерація:

$$\text{1-й крок. } \left(\frac{\partial y}{\partial x_1}\right)^{(2)} = 0.4248 > \varepsilon; \left(\frac{\partial^2 y}{\partial x_1^2}\right)^{(2)} = 12.282; x_1^{(3)} = 2.047 - \frac{0.4248}{12.282} = 2.0124; \bar{x}^{(3,2)} = \begin{bmatrix} 2.0124 \\ 2.0243 \end{bmatrix}.$$

$$\text{2-й крок. } \left(\frac{\partial y}{\partial x_2}\right)^{(3,2)} = 0.219 > \varepsilon; \left(\frac{\partial^2 y}{\partial x_2^2}\right)^{(3,2)} = 12.1458; x_2^{(3)} = 2.0243 - \frac{0.219}{12.1458} = 2.0061;$$

$$\bar{x}^{(3)} = \begin{bmatrix} 2.0124 \\ 2.0061 \end{bmatrix};$$

$$y^{(3)} = -7.9993 < -7.9904 = y^{(2)}.$$

Перевіримо виконання співвідношення (5.6)

$$\left(\frac{\partial y}{\partial x_1}\right)^{(3)} = 0.113 < \varepsilon; \left|\left(\frac{\partial y}{\partial x_2}\right)^{(3)}\right| = |-0.001| < \varepsilon;$$

Співвідношення (3.6) виконується.

$$\bar{x}^* = \begin{bmatrix} 2.0124 \\ 2.0061 \end{bmatrix}; y^* = -7.9993$$

Багатовимірні оптимізаційні задачі з обмеженнями у вигляді рівностей

Математична модель багатовимірної оптимізаційної задачі з обмеженнями у вигляді рівностей має вигляд

$$y(\bar{x}) \rightarrow \underset{\bar{x} \in \Omega}{opt}$$

$$\Omega: f_i(\bar{x}) = 0, \quad i = \overline{1, m, n}$$

Розгляд цієї теми ґрунтується на концепції залежних й незалежних змінних, що полягає у розбитті усіх змінних задачі на два підвектори: $\bar{x} = \begin{bmatrix} \bar{s} \\ \bar{t} \end{bmatrix}$, де \bar{s} – підвектор залежних змінних; \bar{t} – підвектор незалежних змінних.

Необхідні умови локального умовного оптимуму мають вигляд

$$\begin{bmatrix} \delta y \\ \delta \bar{t} \end{bmatrix}^* = 0$$

$$\text{де } \begin{pmatrix} \delta y \\ \delta \bar{t} \end{pmatrix}^T = \begin{pmatrix} \partial y \\ \partial \bar{t} \end{pmatrix}^T - \begin{pmatrix} \partial y \\ \partial \bar{s} \end{pmatrix}^T (\mathbf{W})^{-1} \mathbf{C};$$

$$\mathbf{W} = \begin{bmatrix} \frac{\partial f_1}{\partial s_1} & \frac{\partial f_1}{\partial s_2} & \cdots & \frac{\partial f_1}{\partial s_m} \\ \frac{\partial f_2}{\partial s_1} & \frac{\partial f_2}{\partial s_2} & \cdots & \frac{\partial f_2}{\partial s_m} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \frac{\partial f_m}{\partial s_1} & \frac{\partial f_m}{\partial s_2} & \cdots & \frac{\partial f_m}{\partial s_m} \end{bmatrix}; \mathbf{C} = \begin{bmatrix} \frac{\partial f_1}{\partial t_1} & \frac{\partial f_1}{\partial t_2} & \cdots & \frac{\partial f_1}{\partial t_p} \\ \frac{\partial f_2}{\partial t_1} & \frac{\partial f_2}{\partial t_2} & \cdots & \frac{\partial f_2}{\partial t_p} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \frac{\partial f_m}{\partial t_1} & \frac{\partial f_m}{\partial t_2} & \cdots & \frac{\partial f_m}{\partial t_p} \end{bmatrix}.$$

Достатні умови точки локального мінімуму полягають у додатній визначеності в точці локального мінімуму матриці других умовних похідних функції цілі $\mathbf{S} = \begin{bmatrix} \delta^2 y \\ \delta t_i \delta t_j \end{bmatrix}$.

Матриця має розмір $(p \times p)$ і визначається за формулою

$$\mathbf{S} = \mathbf{P}_{tt} - \mathbf{P}_{ts} \mathbf{W}^{-1} \mathbf{C} - (\mathbf{P}_{ts} \mathbf{W}^{-1} \mathbf{C})^T + (\mathbf{W}^{-1} \mathbf{C})^T \mathbf{P}_{ss} \mathbf{W}^{-1} \mathbf{C},$$

де \mathbf{W}^{-1} , \mathbf{C} – вже знайомі обернена матриця Якобі і матриця управління; \mathbf{P}_{tt} , \mathbf{P}_{ts} , \mathbf{P}_{ss} – підматриці матриці

$$\mathbf{P} = \begin{bmatrix} \mathbf{P}_{ss} & \mathbf{P}_{st} \\ \mathbf{P}_{ts} & \mathbf{P}_{tt} \end{bmatrix} = \mathbf{H} - \sum_{i=1}^m \lambda_i \mathbf{H}_i.$$

Тут \mathbf{H} – вже знайома матриця других похідних функції цілі; \mathbf{H}_i – матриця других похідних i -го обмеження задачі, визначається як

$$\mathbf{H}_i = \begin{bmatrix} \frac{\partial^2 f_i}{\partial x_1^2} & \frac{\partial^2 f_i}{\partial x_1 \partial x_2} & \cdots & \frac{\partial^2 f_i}{\partial x_1 \partial x_n} \\ \frac{\partial^2 f_i}{\partial x_2 \partial x_1} & \frac{\partial^2 f_i}{\partial x_2^2} & \cdots & \frac{\partial^2 f_i}{\partial x_2 \partial x_n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \frac{\partial^2 f_i}{\partial x_n \partial x_1} & \frac{\partial^2 f_i}{\partial x_n \partial x_2} & \cdots & \frac{\partial^2 f_i}{\partial x_n^2} \end{bmatrix}, i = \overline{1, m};$$

λ_i – коефіцієнти чутливості, складові вектора $\bar{\lambda}^T = \left(\frac{\partial y}{\partial \bar{s}} \right)^T \mathbf{W}^{-1}$.

Застосування методу Лагранжа в економіці

Цей метод полягає у заміні функції цілі функцією Лагранжа і подальшому визначенні її стаціонарних точок, що співпадають з стаціонарними точками початкової функції цілі.

Спочатку побудуємо функцію Лагранжа: $L(\bar{x}, \bar{\lambda}) = y(\bar{x}) - \bar{\lambda} \cdot \bar{f}(\bar{x})$,

де $\bar{\lambda}$ – вектор коефіцієнтів чутливості або невизначених множників Лагранжа.

Далі розв'язання задачі полягає у визначенні стаціонарних точок функції Лагранжа, при цьому $\bar{\lambda}$ розглядається як вектор додаткових змінних, а сама функція Лагранжа як функція без обмежень. Стаціонарні точки функції Лагранжа визначаються як рішення системи рівнянь:

$$\begin{cases} \partial L(\bar{x}, \bar{\lambda}) = 0; \\ \frac{\partial L(\bar{x}, \bar{\lambda})}{\partial \bar{\lambda}} = -\bar{f}(\bar{x}) = 0. \end{cases}$$

Розглянемо застосування методу на прикладі вирішення задачі оптимальної реалізації продукції.

Приклад 18. Борошномельний комбінат реалізує борошно двома способами: уроздріб через магазин і оптом через торгових агентів. При продажі x_1 кг борошна через магазин витрати на реалізацію складають x_1^2 грош.од., а при продажі x_2 кг борошна за допомогою торгових агентів – x_2^2 грош.од. Визначити, скільки кг борошна слід продавати кожним способом, щоб витрати на реалізацію були мінімальними, якщо в добу для продажу виділяється 5000 кг борошна.

Розв’язання. Математична модель задачі матиме вигляд:

$$y(\bar{x}) = x_1^2 + x_2^2 \rightarrow \min_{\bar{x} \in \Omega}$$

$$\Omega: \begin{cases} x_1 + x_2 = 5000 \\ x_j \geq 0, j = 1, 2 \end{cases}$$

Функція Лагранжа матиме вигляд $\partial L(\bar{x}, \bar{\lambda}) = x_1^2 + x_2^2 - \lambda(x_1 + x_2 - 5000)$.

а сама система рівнянь матиме вигляд

$$\begin{cases} 2x_1 - \lambda = 0; \\ 2x_2 - \lambda = 0; \\ -x_1 - x_2 + 5000 = 0. \end{cases}$$

Звідки знаходимо стаціонарну точку $\bar{x}^{(0)} = [2500 \ 2500]$; $y(\bar{x}) = 12500000$

Надаючи x_1 значення більше і менше 2500 знаходимо $y(\bar{x})$ і з визначення екстремуму функції отримуємо, що $y(\bar{x})$ при $x_1 = x_2 = 2500$ досягає мінімуму.

Для отримання мінімальних витрат необхідно реалізувати в добу через магазин і торгових агентів по 2500кг борошна, при цьому витрати на реалізацію складуть 12500 тис. грош.од.

Принципи побудови економетричних моделей. Парнолінійна регресія

Прості лінійні регресійні моделі встановлюють лінійну залежність між двома змінними, наприклад, витратами на відпустку та складом родини; витратами на рекламу та обсягом продукції; що випускається, витратами на споживання та валовим національним продуктом (ВНП); зміною ВНП залежно від часу і та ін.

При цьому одна із змінних y вважається залежною змінною та розглядається, як функція від незалежної змінної x .

У загальному вигляді проста вибіркова регресійна модель запишеться так:

$$y = b_0 + b_1 x + e \quad (6.1)$$

де y — вектор спостережень за залежною змінною $y = \{y_1, y_2, \dots, y_n\}$;

x — вектор спостережень за незалежною змінною $x = \{x_1, x_2, \dots, x_n\}$;

b_0, b_1 — оцінки невідомих параметрів регресійної моделі; e — вектор випадкових величин (помилки). Регресійна модель називається лінійною, якщо вона лінійна за своїми параметрами. Отже, модель є лінійною регресійною моделлю.

Оцінка параметрів лінійної регресії за допомогою методу найменших квадратів

Щоб мати явний вигляд залежності, необхідно знайти (оцінити) невідомі параметри b_0, b_1 цієї моделі.

Реальні спостереження y_i і x_i зобразимо точками у системі координат (X,Y) (рис. 6.1).

Таблиця 6.1

i	y_i	x_i
1	25	5
2	30	6
3	35	9
4	45	12
5	65	18

Візуально можна припустити, що між даними є лінійна залежність, тобто їх можна апроксимувати прямою лінією.

Взагалі, існує необмежена кількість прямих $y = b_0 + b_1x$, які можна провести через множину спостережуваних точок. Яку ж з них вибрати? Щоб це визначити, потрібно мати у розпорядженні певний критерій, що дозволяв би вибрати з множини можливих прямих "найкращу" з точки зору даного критерію. Найпоширенішим є критерій мінімізації суми квадратів відхилень. На рис. 6.1, наприклад, пряма (1), як і інші, розташована таким чином, що деякі точки знаходяться вище, а деякі нижче цієї прямої, на основі чого можна встановити відхилення (помилки) відносно цієї прямої:

$$e_i = y_i - \hat{y}_i = y_i - b_0 - b_1x_i, i = \overline{1, n}.$$

Де \hat{y} — і-та точка на прямій, яка відповідає значенню x_i .




Рис. 6.1

Відхилення, або помилки, ще інколи називають залишками. Логічно, що треба проводити пряму таким чином, щоб сума квадратів помилок була мінімальною. В цьому і полягає *критерій найменших квадратів*: невідомі параметри b_0, b_1 визначаються таким чином, щоб мінімізувати $\sum_{i=1}^n e_i^2$.

Оцінка параметрів, обчислених за методом найменших квадратів має вигляд

$$b_1 = \frac{\frac{1}{n} \left(\sum_{i=1}^n x_i y_i \right) - \bar{x} \bar{y}}{\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i^2 - \bar{x}^2},$$

$$\text{де } \bar{x} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i; \quad \bar{y} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n y_i$$

$$b_0 = \bar{y} - b_1 \bar{x}$$

Вираз для b_1 можна записати ще таким чином:

$$b_1 = \frac{\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y})}{\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2} = \frac{\text{cov}(x, y)}{\text{var}(x)}.$$

Тепер можемо записати у явному вигляді регресію y від x , у якій параметри обчислені за методом найменших квадратів. Її інколи називають регресією найменших квадратів у від x . Маємо:

$$\hat{y} = b_0 + b_1 x,$$

Або

$$y = \hat{y} + e = b_0 + b_1 x + e.$$

Коефіцієнт кореляції

Найпростішим критерієм, який дає кількісну оцінку зв'язку між двома показниками, є коефіцієнт кореляції. Він розраховується за формулою:

$$r_{xy} = \frac{\text{cov}(x, y)}{\sqrt{\text{var}(x) \text{var}(y)}} = \frac{\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y})}{\sqrt{\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2 \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (y_i - \bar{y})^2}},$$

де $\text{cov}(x, y)$ — коефіцієнт коваріації між x та y ; $\text{var}(x)$ — дисперсія змінної x ; $\text{var}(y)$ — дисперсія змінної y .

Коефіцієнт кореляції дорівнює відношенню коефіцієнта коваріації до кореня з добутку двох дисперсій. Коефіцієнт кореляції, на відміну від коефіцієнта коваріації, є вже не абсолютною, а відносною мірою зв'язку між двома факторами. Тому значення коефіцієнта кореляції, як можна побачити з виразу, завжди розташовані між -1 та +1 ($-1 < r_{xy} < 1$). Позитивне значення коефіцієнта кореляції свідчить про прямий зв'язок між показниками, а негативне — про зворотний зв'язок. Коли коефіцієнт кореляції прямує за абсолютною величиною до 1, це свідчить про наявність сильного зв'язку ($r \rightarrow \pm 1$ — щільність зв'язку велика); у протилежному випадку, коли коефіцієнт кореляції прямує до нуля ($r \rightarrow 0$), зв'язку немає.

Коефіцієнт детермінації

Поряд з коефіцієнтом кореляції використовується ще один критерій, за допомогою якого також вимірюється щільність зв'язку між двома або більше показниками та перевіряється адекватність (відповідність) побудованої регресійної моделі реальній дійсності. Тобто дається відповідь на запитання, чи справді зміна значення y лінійно залежить саме від зміни значення x , а не відбувається під впливом різних випадкових факторів. Таким критерієм є коефіцієнт детермінації.

Коефіцієнт детермінації дорівнює квадрату коефіцієнта кореляції:

$$R^2 = r^2$$

Коефіцієнт детермінації завжди позитивний і перебуває у межах від нуля до одиниці ($0 < R^2 < 1$).

Приклад 19. У табл. 6.2 наведено умовні данні спостережень витрат y на відпустку робітника залежно від кількості членів його родини x . Побудувати регресійну модель залежності y і x , знайти оцінки її параметрів.

Таблиця 6.2

Кількість членів родини	Витрати на відпустку, ум. од.
x	y
1	16
2	12
2	23
4	19
6	30
$x=3$	$y=20$

Розв'язання. Для того, щоб встановити залежність витрат на відпустку від розмірів родини, припустимо, що ця залежність описується лінійною функцією,

$$\hat{y} = b_0 + b_1 x,$$

тобто її можна розглядати, як просту лінійну регресію (рис 6.2)

$$y = \hat{y} + e = b_0 + b_1 x + e.$$

Встановимо її невідомі параметри за формулами

$$b_1 = \frac{\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y})}{\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2} = \frac{\text{cov}(x, y)}{\text{var}(x)} \text{ та } b_0 = \bar{y} - b_1 \bar{x}.$$

Незважаючи на громіздкість цієї формули з першого погляду, вона найчастіше використовується на практиці.

Для підрахунку b_1 нам потрібно визначити $n, \sum_{i=1}^n x_i, \sum_{i=1}^n y_i, \sum_{i=1}^n x_i y_i, \sum_{i=1}^n x_i^2$.

Відобразимо ці дані за допомогою табл. 6.3

Таблиця 6.3

i	x_i	y_i	$x_i y_i$	x_i^2	\hat{y}_i	$e_i = y_i - \hat{y}_i$
1	1	16	16	1	14.74	1.26
2	2	12	24	4	17.37	-5.37
3	2	23	46	4	17.37	5.63
4	4	19	76	16	22.63	-3.63
5	6	30	180	36	27.89	2.11
Σ	15	100	342	61	100	0

Згідно з табл.6.3

$$b_1 = \frac{342 - 15 \cdot \frac{100}{5}}{61 - \frac{225}{5}} = \frac{42}{61 - 45} \approx 2,63,$$

$$b_0 = \bar{y} - b_1 \bar{x} = 20 - 2,63 \cdot 3 = 12,11,$$

$$\hat{y}_i = 12,11 + 2,63x_i.$$

Це рівняння дає для кожного спостережуваного значення x_i значення \hat{y}_i та $e_i = y_i - \hat{y}_i$ (дві останні колонки табл. 6.4). Підкреслимо, що сума оцінених значень дорівнює сумі фактичних значень y_i , а сума помилок дорівнює 0.




Рис. 6.2

Приклад 20. Спостережені значення прибутку фабрики y (ум.од) і її затрат x (ум.од) на рекламу задані в табл.6.4. Побудувати регресійну модель залежності y і x , знайти оцінки її параметрів. Обчисліть коефіцієнти кореляції та детермінації.

Таблиця 6.4

i	1	2	3	4	5	6
x_i	20	14	12	20	33	38
y_i	75	85	92	88	72	99

Розв'язання. Всі обчислення зведемо в табл. 6.5. Необхідні підсумкові значення будемо заносити в колонку Σ .

Таблиця 6.5

i	x_i	y_i	$(x_i - \bar{x})$	$(y_i - \bar{y})$	$(y_i - \bar{y})^2$	$(x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y})$	$(x_i - \bar{x})^2$
1	20	75	-2.83	-10.17	103.4	28.81	8.03
2	14	85	-8.83	-0.17	0.0289	1.47	78.03
3	12	92	-10.83	6.83	46.649	-74.03	117.36
4	20	88	-2.83	2.83	8.01	-8.03	8.03
5	33	72	10.17	-13.17	173.45	-133.86	103.36
6	38	99	15.17	13.83	191.269	209.81	230.03
Σ	137	511			522.75	224.17	544.84

Згідно з табл. 6.5 $\bar{x} = 22,83$; $\bar{y} = 85,16$.

$$b_1 = \frac{\sum (x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y})}{\sum (x_i - \bar{x})^2} = \frac{24,17}{544,83} = 0,04436.$$

$$b_0 = \bar{y} - b_1 \bar{x} = 85,16 - 0,04436 \cdot 22,83 = 84,15.$$

$$\hat{y}_i = 84,15 + 0,04436x.$$

У рівнянні прямої коефіцієнт b_1 є тангенсом куту нахилу прямої до осі Ox . Якщо $b_1 > 0$, то між змінною y і змінною x існує позитивний (прямий) зв'язок, якщо $b_1 < 0$ - негативний (зворотний), при $b_1 = 0$ змінні x і y незалежні одна від одної.

В нашому прикладі зв'язок між y та x дуже слабкий, бо $b_1 = 0,04436$.

Коефіцієнт b_0 є точкою перетину прямої з віссю Oy .

$$\text{cov}(x, y) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y}) = \frac{24,17}{6} = 4,02.$$

$$\text{var}(x) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2 = \frac{544,84}{6} = 90,8.$$

$$\text{var}(y) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (y_i - \bar{y})^2 = \frac{522,25}{6} = 87,13.$$

Розрахуємо коефіцієнт кореляції:

$$r_{xy} = \frac{\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y})}{\sqrt{\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2} \sqrt{\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (y_i - \bar{y})^2}} = \frac{4,02}{\sqrt{90,8} \sqrt{87,13}} = 0,045.$$

Коефіцієнт кореляції також свідчить про слабкий зв'язок між y та x .

Розрахуємо коефіцієнт детермінації:

$$r^2 = \frac{4,02 \cdot 4,02}{90,8 \cdot 87,13} = 0,002.$$

Лінійні моделі множинної регресії

Узагальнена множинна лінійна регресійна модель має вигляд:

$$y = \beta_0 + \beta_1 x_1 + \beta_2 x_2 + \dots + \beta_p x_p + \varepsilon$$

де y — залежна змінна; x_1, x_2, \dots, x_p — незалежні змінні (або фактори); $\beta_0, \beta_1, \dots, \beta_p$ — параметри моделі (константи), які потрібно оцінити; ε — неспостережувана випадкова величина.

Узагальнена регресійна модель — це модель, яка дійсна для всієї генеральної сукупності. На відміну від узагальненої регресійної, вибіркова модель будується для певної виборки.

Вибіркова лінійна множинна модель має такий вигляд:

$$y = b_0 + b_1 x_1 + \dots + b_p x_p + e, \quad (7.1)$$

де y — залежна змінна;

x_1, x_2, \dots, x_p — незалежні змінні (або фактори);

b_1, b_2, \dots, b_p — оцінки невідомих параметрів виборочної моделі;

e — випадкова величина (помилка).

Лінійною регресійною моделлю називають модель, що лінійна за своїми параметрами.

За введеними нами позначеннями, множинна лінійна регресійна модель має p незалежних змінних, або факторів, які впливають на залежну змінну y , та $(p + 1)$ невідомих параметрів, які потрібно оцінити.

Розглянемо двофакторну модель

$$y = b_0 + b_1x_1 + b_2x_2 + e = \hat{y} + e$$

Параметри моделі b_1, b_2, b_0 треба оцінити за методом найменших квадратів.

$$b_0 = \bar{y} - b_1\bar{x}_1 - b_2\bar{x}_2$$

$$b_1 = \frac{\sum \tilde{x}_{i1} \tilde{y}_i \sum \tilde{x}_{i2}^2 - \sum \tilde{x}_{i2} \tilde{y}_i \sum \tilde{x}_{i1} \tilde{x}_{i2}}{\sum \tilde{x}_{i1}^2 \sum \tilde{x}_{i2}^2 - (\sum \tilde{x}_{i1} \tilde{x}_{i2})^2},$$

$$b_2 = \frac{\sum \tilde{x}_{i2} \tilde{y}_i \sum \tilde{x}_{i1}^2 - \sum \tilde{x}_{i1} \tilde{y}_i \sum \tilde{x}_{i1} \tilde{x}_{i2}}{\sum \tilde{x}_{i1}^2 \sum \tilde{x}_{i2}^2 - (\sum \tilde{x}_{i1} \tilde{x}_{i2})^2},$$

де $\tilde{x}_{i1} = x_{i1} - \bar{x}_1$; $\tilde{x}_{i2} = x_{i2} - \bar{x}_2$; $\tilde{y} = y_i - \bar{y}$ – відхилення змінних.

Приклад 21. Досліджується рівень середньомісячної заробітної плати y (ум.од.) в залежності від продуктивності праці x_1 (ум.од.) і фондоємності продукції x_2 (ум.од.) для 6 споріднених за випуском продукції фірм. Дані спостережень наведені в табл.7.1 Побудувати лінійну регресію для даного процесу, знайти оцінки її параметрів.

Таблиця 7.1

x_1	2	4	6	7	8
x_2	9	6	12	11	20
y	55	46	35	67	72

Розв’язання. Рівнянням лінійної регресії заданого умовою процесу є

$$y = \beta_0 + \beta_1x_1 + \beta_2x_2 + \varepsilon.$$

Оцінками її параметрів $\beta_0, \beta_1, \beta_2$ мають бути параметри регресії b_0, b_1, b_2 , що будуються за вибірковими даними :

$$y = b_0 + b_1x_1 + b_2x_2 + e = \hat{y} + e$$

Параметри моделі b_1, b_2, b_0 треба оцінити за методом найменших квадратів. Знайдемо параметри моделі, за матричною формою запису системи нормальних рівнянь.

$$Y = \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ \vdots \\ y_n \end{pmatrix}, X = \begin{pmatrix} 1 & x_{11} & x_{12} & \cdots & x_{1m} \\ 1 & x_{21} & x_{22} & \cdots & x_{2m} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & x_{n1} & x_{n2} & \cdots & x_{nm} \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} b_0 \\ b_1 \\ \vdots \\ b_m \end{pmatrix}, e = \begin{pmatrix} e_1 \\ e_2 \\ \vdots \\ e_n \end{pmatrix}.$$

$$Y = XB + e,$$

$X^T Y = (X^T X) B$ – матрична форма системи нормальних рівнянь.

$B = (X^T X)^{-1} X^T Y$ — матрична форма розв'язку системи нормальних рівнянь. Тут $(X^T X)^{-1}$ — матриця, обернена до матриці $(X^T X)$. Стовець B називається вектором оцінок коефіцієнтів (параметрів) регресії.

$$X^T X = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 2 & 4 & 6 & 7 & 8 \\ 9 & 6 & 12 & 11 & 20 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 2 & 9 \\ 1 & 4 & 6 \\ 1 & 6 & 12 \\ 1 & 7 & 11 \\ 1 & 8 & 20 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 5 & 27 & 58 \\ 27 & 169 & 351 \\ 58 & 351 & 782 \end{bmatrix}$$

$$X^T Y = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 2 & 4 & 6 & 7 & 8 \\ 9 & 6 & 12 & 11 & 20 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 55 \\ 46 \\ 35 \\ 67 \\ 72 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 275 \\ 1549 \\ 3368 \end{bmatrix}$$

$$(X^T X)^{-1} = \begin{bmatrix} 1.62 & -0.14 & -0.06 \\ -0.14 & 0.098 & -0.03 \\ -0.05 & -0.03 & 0.02 \end{bmatrix}$$

$$B = (X^T X)^{-1} X^T Y = \begin{bmatrix} 1.62 & -0.14 & -0.06 \\ -0.14 & 0.098 & -0.03 \\ -0.05 & -0.03 & 0.02 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 275 \\ 1549 \\ 3368 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 35.76 \\ 0.24 \\ 1.55 \end{bmatrix}$$

Таким чином, одержана теоретична лінійна залежність між факторами x_1 і x_2 та \hat{y}

$$\hat{y} = 35.76 + 0.24x_1 + 1.55x_2$$

Індивідуальні завдання з теми “Лінійне програмування: симплекс-метод”

Варіант 1

За допомогою симплекс-методу розв'язати задачу лінійного програмування:

$$y(\bar{x}) = 7x_1 - 2x_2 \rightarrow \min_{\bar{x} \in \Omega}$$

$$\Omega: \begin{cases} x_1 + x_2 \leq 5 \\ 2x_1 - 3x_2 \leq 6 \\ 3x_1 + x_2 \geq -3 \\ x_1 \geq 0, x_2 \geq 0 \end{cases}$$

Варіант 2

За допомогою симплекс-методу розв'язати задачу лінійного програмування:

$$y(\bar{x}) = -7x_1 + 2x_2 \rightarrow \max_{\bar{x} \in \Omega}$$

$$\Omega: \begin{cases} x_1 + x_2 \geq -1 \\ 5x_1 + x_2 \geq -3 \\ -3x_1 + x_2 \leq 3 \\ 2x_1 + x_2 \leq 4 \\ x_1 \geq 0, x_2 \geq 0 \end{cases}$$

Варіант 3

За допомогою симплекс-методу розв'язати задачу лінійного програмування:

$$y(\bar{x}) = x_1 + 2x_2 \rightarrow \max_{\bar{x} \in \Omega}$$

$$\Omega: \begin{cases} x_1 - x_2 \geq -6 \\ 2x_1 - x_2 \geq -4 \\ x_1 + x_2 \leq 8 \\ x_1 \geq 0, x_2 \geq 0 \end{cases}$$

Варіант 4

За допомогою симплекс-методу розв'язати задачу лінійного програмування:

$$y(\bar{x}) = 3x_1 + 2x_2 \rightarrow \max_{\bar{x} \in \Omega}$$

$$\Omega: \begin{cases} -2x_1 + x_2 \leq 4 \\ x_1 - x_2 \geq -6 \\ 3x_1 + x_2 \leq 18 \\ x_1 \geq 0, x_2 \geq 0 \end{cases}$$

Варіант 5

За допомогою симплекс-методу розв'язати задачу лінійного програмування:

$$y(\bar{x}) = 2x_1 + 3x_2 \rightarrow \max_{\bar{x} \in \Omega}$$

$$\Omega: \begin{cases} x_1 - 2x_2 \leq 4 \\ x_1 - x_2 \leq 6 \\ 2x_1 + x_2 \leq 8 \\ x_1 \geq 0, x_2 \geq 0 \end{cases}$$

Варіант 6

За допомогою симплекс-методу розв'язати задачу лінійного програмування:

$$y(\bar{x}) = x_1 + 2x_2 \rightarrow \max_{\bar{x} \in \Omega}$$

$$\Omega: \begin{cases} -x_1 + 3x_2 \leq 6 \\ x_1 + x_2 \leq 3 \\ 2x_1 - x_2 \geq -3 \\ x_1 \geq 0, x_2 \geq 0 \end{cases}$$

Варіант 7

За допомогою симплекс-методу розв'язати задачу лінійного програмування:

$$y(\bar{x}) = 2x_1 + 5x_2 \rightarrow \max_{\bar{x} \in \Omega}$$

$$\Omega: \begin{cases} -2x_1 + x_2 \leq 3 \\ x_1 - 2x_2 \leq 5 \\ x_1 + x_2 \leq 6 \\ x_1 \geq 0, x_2 \geq 0 \end{cases}$$

Варіант 8

За допомогою симплекс-методу розв'язати задачу лінійного програмування:

$$y(\bar{x}) = 2x_1 + 3x_2 \rightarrow \max_{\bar{x} \in \Omega}$$

$$\Omega: \begin{cases} x_1 - 2x_2 \leq 4 \\ 2x_1 - 3x_2 \leq 10 \\ 2x_1 + x_2 \leq 12 \\ x_1 \geq 0, x_2 \geq 0 \end{cases}$$

Варіант 9

За допомогою симплекс-методу розв'язати задачу лінійного програмування:

$$y(\bar{x}) = x_1 + 2x_2 \rightarrow \max_{\bar{x} \in \Omega}$$

$$\Omega: \begin{cases} x_1 + x_2 \leq 8 \\ -2x_1 + x_2 \leq 4 \\ x_1 - x_2 \geq -6 \\ x_1 \geq 0, x_2 \geq 0 \end{cases}$$

Варіант 10

За допомогою симплекс-методу розв'язати задачу лінійного програмування:

$$y(\bar{x}) = 2x_1 + x_2 \rightarrow \max_{\bar{x} \in \Omega}$$

$$\Omega: \begin{cases} x_1 - 2x_2 \leq 6 \\ x_1 + x_2 \leq 5 \\ x_1 - x_2 \leq 6 \\ x_1 \geq 0, x_2 \geq 0 \end{cases}$$

Варіант 11

За допомогою симплекс-методу розв'язати задачу лінійного програмування:

$$y(\bar{x}) = 2x_1 + 3x_2 \rightarrow \max_{\bar{x} \in \Omega}$$

$$\Omega: \begin{cases} 2x_1 + x_2 \leq 3 \\ x_1 - 2x_2 \leq 4 \\ x_1 - x_2 \leq 6 \\ x_1 \geq 0, x_2 \geq 0 \end{cases}$$

Варіант 12

За допомогою симплекс-методу розв'язати задачу лінійного програмування:

$$y(\bar{x}) = x_1 + 2x_2 \rightarrow \max_{\bar{x} \in \Omega}$$

$$\Omega: \begin{cases} -2x_1 + x_2 \leq 4 \\ -x_1 + x_2 \leq 6 \\ x_1 + x_2 \leq 8 \\ x_1 \geq 0, x_2 \geq 0 \end{cases}$$

Варіант 13

За допомогою симплекс-методу розв'язати задачу лінійного програмування:

$$y(\bar{x}) = 3x_1 + 2x_2 \rightarrow \max_{\bar{x} \in \Omega}$$

$$\Omega: \begin{cases} x_1 + x_2 \leq 3 \\ x_1 - x_2 \geq -6 \\ 2x_1 - x_2 \geq -4 \\ x_1 \geq 0, x_2 \geq 0 \end{cases}$$

Варіант 14

За допомогою симплекс-методу розв'язати задачу лінійного програмування:

$$y(\bar{x}) = 2x_1 + 2x_2 \rightarrow \max_{\bar{x} \in \Omega}$$

$$\Omega: \begin{cases} x_1 + x_2 \leq 8 \\ 2x_1 - x_2 \leq 6 \\ x_1 - 2x_2 \leq 4 \\ x_1 \geq 0, x_2 \geq 0 \end{cases}$$

Варіант 15

За допомогою симплекс-методу розв'язати задачу лінійного програмування:

$$y(\bar{x}) = 2x_1 + x_2 \rightarrow \max_{\bar{x} \in \Omega}$$

$$\Omega: \begin{cases} x_1 - x_2 \leq 8 \\ x_1 + x_2 \leq 8 \\ 2x_1 - 3x_2 \leq 10 \\ x_1 \geq 0, x_2 \geq 0 \end{cases}$$

Варіант 16

За допомогою симплекс-методу розв'язати задачу лінійного програмування:

$$y(\bar{x}) = -7x_1 + 2x_2 \rightarrow \max_{\bar{x} \in \Omega}$$

$$\Omega: \begin{cases} x_1 - x_2 \leq 6 \\ x_1 - 2x_2 \leq 4 \\ -2x_1 + x_2 \leq 3 \\ x_1 \geq 0, x_2 \geq 0 \end{cases}$$

Варіант 17

За допомогою симплекс-методу розв'язати задачу лінійного програмування:

$$y(\bar{x}) = 2x_1 + 3x_2 \rightarrow \max_{\bar{x} \in \Omega}$$

$$\Omega: \begin{cases} 2x_1 + x_2 \leq 3 \\ x_1 - 2x_2 \leq 4 \\ x_1 - x_2 \leq 6 \\ x_1 \geq 0, x_2 \geq 0 \end{cases}$$

Варіант 18

За допомогою симплекс-методу розв'язати задачу лінійного програмування:

$$y(\bar{x}) = 2x_1 + x_2 \rightarrow \max_{\bar{x} \in \Omega}$$

$$\Omega: \begin{cases} x_1 + x_2 \leq 3 \\ x_1 - x_2 \leq 6 \\ x_1 - 2x_2 \leq 4 \\ x_1 \geq 0, x_2 \geq 0 \end{cases}$$

Варіант 19

За допомогою симплекс-методу розв'язати задачу лінійного програмування:

$$y(\bar{x}) = 3x_1 + 2x_2 \rightarrow \min_{\bar{x} \in \Omega}$$

$$\Omega: \begin{cases} x_1 + 2x_2 \leq 3 \\ x_1 - x_2 \geq -6 \\ -2x_1 + x_2 \leq 4 \\ x_1 \geq 0, x_2 \geq 0 \end{cases}$$

Варіант 20

За допомогою симплекс-методу розв'язати задачу лінійного програмування:

$$y(\bar{x}) = 2x_1 + x_2 \rightarrow \max_{\bar{x} \in \Omega}$$

$$\Omega: \begin{cases} x_1 + x_2 \leq 8 \\ x_1 - x_2 \leq 6 \\ x_1 - 2x_2 \leq 4 \\ x_1 \geq 0, x_2 \geq 0 \end{cases}$$

Варіант 21

За допомогою симплекс-методу розв'язати задачу лінійного програмування:

$$y(\bar{x}) = 2x_1 + 5x_2 \rightarrow \max_{\bar{x} \in \Omega}$$

$$\Omega: \begin{cases} 2x_1 + x_2 \leq 3 \\ x_1 - x_2 \leq 6 \\ x_1 - 2x_2 \leq 4 \\ x_1 \geq 0, x_2 \geq 0 \end{cases}$$

Варіант 22

За допомогою симплекс-методу розв'язати задачу лінійного програмування:

$$y(\bar{x}) = 3x_1 + x_2 \rightarrow \max_{\bar{x} \in \Omega}$$

$$\Omega: \begin{cases} x_1 - x_2 \geq -6 \\ -2x_1 + x_2 \leq 4 \\ x_1 + 2x_2 \leq 3 \\ x_1 \geq 0, x_2 \geq 0 \end{cases}$$

Варіант 23

За допомогою симплекс-методу розв'язати задачу лінійного програмування:

$$y(\bar{x}) = 2x_1 - 4x_2 \rightarrow \min_{\bar{x} \in \Omega}$$

$$\Omega: \begin{cases} -x_1 + x_2 \leq 3 \\ 5x_1 + 3x_2 \leq 27 \\ -3x_1 - 2x_2 \leq 6 \\ x_1 \geq 0, x_2 \geq 0 \end{cases}$$

Варіант 24

За допомогою симплекс-методу розв'язати задачу лінійного програмування:

$$y(\bar{x}) = x_1 + 2x_2 \rightarrow \max_{\bar{x} \in \Omega}$$

$$\Omega: \begin{cases} 2x_1 - x_2 \geq -4 \\ -x_1 + x_2 \leq 6 \\ x_1 + x_2 \leq 3 \\ x_1 \geq 0, x_2 \geq 0 \end{cases}$$

Варіант 25

За допомогою симплекс-методу розв'язати задачу лінійного програмування:

$$y(\bar{x}) = 2x_1 + 3x_2 \rightarrow \max_{\bar{x} \in \Omega}$$

$$\Omega: \begin{cases} x_1 - 2x_2 \leq 4 \\ 2x_1 - 3x_2 \leq 10 \\ 2x_1 + x_2 \leq 3 \\ x_1 \geq 0, x_2 \geq 0 \end{cases}$$

Варіант 26

За допомогою симплекс-методу розв'язати задачу лінійного програмування:

$$y(\bar{x}) = 2x_1 + 5x_2 \rightarrow \max_{\bar{x} \in \Omega}$$

$$\Omega: \begin{cases} -2x_1 + x_2 \leq 3 \\ x_1 - 2x_2 \leq 5 \\ x_1 + x_2 \leq 6 \\ x_1 \geq 0, x_2 \geq 0 \end{cases}$$

Варіант 27

За допомогою симплекс-методу розв'язати задачу лінійного програмування:

$$y(\bar{x}) = -7x_1 + 2x_2 \rightarrow \max_{\bar{x} \in \Omega}$$

$$\Omega: \begin{cases} x_1 + x_2 \geq -1 \\ 5x_1 + x_2 \geq -3 \\ -3x_1 + x_2 \leq 3 \\ 2x_1 + x_2 \leq 4 \\ x_1 \geq 0, x_2 \geq 0 \end{cases}$$

Варіант 28

За допомогою симплекс-методу розв'язати задачу лінійного програмування:

$$y(\bar{x}) = x_1 + 2x_2 \rightarrow \max_{\bar{x} \in \Omega}$$

$$\Omega: \begin{cases} x_1 - x_2 \geq -6 \\ 2x_1 - x_2 \geq -4 \\ x_1 + x_2 \leq 8 \\ x_1 \geq 0, x_2 \geq 0 \end{cases}$$

Варіант 29

За допомогою симплекс-методу розв'язати задачу лінійного програмування:

$$y(\bar{x}) = 3x_1 + 2x_2 \rightarrow \max_{\bar{x} \in \Omega}$$

$$\Omega: \begin{cases} -2x_1 + x_2 \leq 4 \\ x_1 - x_2 \geq -6 \\ x_1 + 2x_2 \leq 12 \\ x_1 \geq 0, x_2 \geq 0 \end{cases}$$

Варіант 30

За допомогою симплекс-методу розв'язати задачу лінійного програмування:

$$y(\bar{x}) = 2x_1 + 3x_2 \rightarrow \max_{\bar{x} \in \Omega}$$

$$\Omega: \begin{cases} x_1 - x_2 \leq 6 \\ x_1 - 2x_2 \leq 4 \\ 2x_1 + x_2 \leq 8 \\ x_1 \geq 0, x_2 \geq 0 \end{cases}$$

Індивідуальні завдання з теми

“Лінійне програмування: диференційний алгоритм”

Варіант 1

За допомогою диференційного алгоритму розв'язати задачу лінійного програмування:

$$y(\bar{x}) = 2x_1 + x_2 - 3x_3 + 1 \rightarrow \min_{\bar{x} \in \Omega}$$

$$\Omega: \begin{cases} -2x_1 - x_2 - x_3 - x_4 + 4 = 0 \\ -x_1 + x_2 - x_3 - x_5 - 2 = 0 \\ \bar{x} \geq 0 \end{cases}$$

Варіант 2

За допомогою диференційного алгоритму розв'язати задачу лінійного програмування:

$$y(\bar{x}) = 2x_1 + x_2 - 3x_3 + 2 \rightarrow \min_{\bar{x} \in \Omega}$$

$$\Omega: \begin{cases} -x_1 + x_2 - x_3 - x_5 - 2 = 0 \\ -2x_1 - x_2 - x_3 - x_4 + 4 = 0 \\ \bar{x} \geq 0 \end{cases}$$

Варіант 3

За допомогою диференційного алгоритму розв'язати задачу лінійного програмування:

$$y(\bar{x}) = x_1 + 2x_2 - 3x_3 + 3 \rightarrow \min_{\bar{x} \in \Omega}$$

$$\Omega: \begin{cases} -x_1 - 2x_2 - x_3 - x_4 + 4 = 0 \\ x_1 - x_2 - x_3 - x_5 - 2 = 0 \\ \bar{x} \geq 0 \end{cases}$$

Варіант 4

За допомогою диференційного алгоритму розв'язати задачу лінійного програмування:

$$y(\bar{x}) = x_1 + 2x_2 - 3x_3 + 4 \rightarrow \min_{\bar{x} \in \Omega}$$

$$\Omega: \begin{cases} x_1 - x_2 - x_3 - x_4 - 2 = 0 \\ -x_1 - 2x_2 - x_3 - x_5 + 4 = 0 \\ \bar{x} \geq 0 \end{cases}$$

Варіант 5

За допомогою диференційного алгоритму розв'язати задачу лінійного програмування:

$$y(\bar{x}) = 2x_1 - 3x_2 + x_3 + 5 \rightarrow \min_{\bar{x} \in \Omega}$$

$$\Omega: \begin{cases} -2x_1 - x_2 - x_3 - x_4 + 8 = 0 \\ -x_1 - x_2 + x_3 - x_5 - 4 = 0 \\ \bar{x} \geq 0 \end{cases}$$

Варіант 6

За допомогою диференційного алгоритму розв'язати задачу лінійного програмування:

$$y(\bar{x}) = 2x_1 - 3x_2 + x_3 + 6 \rightarrow \min_{\bar{x} \in \Omega}$$

$$\Omega: \begin{cases} -x_1 - x_2 + x_3 - x_4 - 4 = 0 \\ -2x_1 - x_2 - x_3 - x_5 + 8 = 0 \\ \bar{x} \geq 0 \end{cases}$$

Варіант 7

За допомогою диференційного алгоритму розв'язати задачу лінійного програмування:

$$y(\bar{x}) = -3x_1 + 2x_2 + x_3 + 7 \rightarrow \min_{\bar{x} \in \Omega}$$

$$\Omega: \begin{cases} -x_1 - 2x_2 - x_3 - x_4 + 8 = 0 \\ -x_1 - x_2 + x_3 - x_5 - 4 = 0 \\ \bar{x} \geq 0 \end{cases}$$

Варіант 8

За допомогою диференційного алгоритму розв'язати задачу лінійного програмування:

$$y(\bar{x}) = -3x_1 + 2x_2 + x_3 + 8 \rightarrow \min_{\bar{x} \in \Omega}$$

$$\Omega: \begin{cases} -x_1 - x_2 + x_3 - x_4 - 4 = 0 \\ -x_1 - 2x_2 - x_3 - x_5 + 8 = 0 \\ \bar{x} \geq 0 \end{cases}$$

Варіант 9

За допомогою диференційного алгоритму розв'язати задачу лінійного програмування:

$$y(\bar{x}) = x_1 - 3x_2 + 2x_3 + 9 \rightarrow \min_{\bar{x} \in \Omega}$$

$$\Omega: \begin{cases} -x_1 - x_2 - 2x_3 - x_4 + 2 = 0 \\ x_1 - x_2 - x_3 - x_5 - 1 = 0 \\ \bar{x} \geq 0 \end{cases}$$

Варіант 10

За допомогою диференційного алгоритму розв'язати задачу лінійного програмування:

$$y(\bar{x}) = x_1 - 3x_2 + 2x_3 + 10 \rightarrow \min_{\bar{x} \in \Omega}$$

$$\Omega: \begin{cases} x_1 - x_2 - x_3 - x_4 - 1 = 0 \\ -x_1 - x_2 - 2x_3 - x_5 + 2 = 0 \\ \bar{x} \geq 0 \end{cases}$$

Варіант 11

За допомогою диференційного алгоритму розв'язати задачу лінійного програмування:

$$y(\bar{x}) = -3x_1 + x_2 + 2x_3 + 11 \rightarrow \min_{\bar{x} \in \Omega}$$

$$\Omega: \begin{cases} -x_1 - x_2 - 2x_3 - x_4 + 6 = 0 \\ -x_1 + x_2 - x_3 - x_5 - 3 = 0 \\ \bar{x} \geq 0 \end{cases}$$

Варіант 12

За допомогою диференційного алгоритму розв'язати задачу лінійного програмування:

$$y(\bar{x}) = -3x_1 + x_2 + 2x_3 + 12 \rightarrow \min_{\bar{x} \in \Omega}$$

$$\Omega: \begin{cases} -x_1 + x_2 - x_3 - x_4 - 3 = 0 \\ -x_1 - x_2 - 2x_3 - x_5 - 6 = 0 \\ \bar{x} \geq 0 \end{cases}$$

Варіант 13

За допомогою диференційного алгоритму розв'язати задачу лінійного програмування:

$$y(\bar{x}) = 4x_1 + x_2 - 2x_3 + 13 \rightarrow \min_{\bar{x} \in \Omega}$$
$$\Omega: \begin{cases} -2x_1 + x_2 - x_3 - x_4 - 1 = 0 \\ -2x_1 - x_2 - 3x_3 - x_5 + 5 = 0 \\ \bar{x} \geq 0 \end{cases}$$

Варіант 14

За допомогою диференційного алгоритму розв'язати задачу лінійного програмування:

$$y(\bar{x}) = 4x_1 + x_2 - 2x_3 + 14 \rightarrow \min_{\bar{x} \in \Omega}$$
$$\Omega: \begin{cases} -2x_1 - x_2 - 3x_3 - x_4 + 5 = 0 \\ -2x_1 + x_2 - x_3 - x_5 - 1 = 0 \\ \bar{x} \geq 0 \end{cases}$$

Варіант 15

За допомогою диференційного алгоритму розв'язати задачу лінійного програмування:

$$y(\bar{x}) = x_1 + 4x_2 - 2x_3 + 15 \rightarrow \min_{\bar{x} \in \Omega}$$
$$\Omega: \begin{cases} x_1 - 2x_2 - x_3 - x_4 - 2 = 0 \\ -x_1 - 2x_2 - 3x_3 - x_5 + 10 = 0 \\ \bar{x} \geq 0 \end{cases}$$

Варіант 16

За допомогою диференційного алгоритму розв'язати задачу лінійного програмування:

$$y(\bar{x}) = x_1 + 4x_2 - 2x_3 + 16 \rightarrow \min_{\bar{x} \in \Omega}$$
$$\Omega: \begin{cases} -x_1 - 2x_2 - 3x_3 - x_4 + 10 = 0 \\ x_1 - 2x_2 - x_3 - x_5 - 2 = 0 \\ \bar{x} \geq 0 \end{cases}$$

Варіант 17

За допомогою диференційного алгоритму розв'язати задачу лінійного програмування:

$$y(\bar{x}) = -2x_1 + 4x_2 + x_3 + 17 \rightarrow \min_{\bar{x} \in \Omega}$$
$$\Omega: \begin{cases} -x_1 - 2x_2 + x_3 - x_4 - 1 = 0 \\ -3x_1 - x_2 - x_3 - x_5 + 5 = 0 \\ \bar{x} \geq 0 \end{cases}$$

Варіант 18

За допомогою диференційного алгоритму розв'язати задачу лінійного програмування:

$$y(\bar{x}) = -2x_1 + 4x_2 + x_3 + 18 \rightarrow \min_{\bar{x} \in \Omega}$$

$$\Omega: \begin{cases} -3x_1 - x_2 - x_3 - x_4 + 5 = 0 \\ -x_1 - 2x_2 + x_3 - x_5 - 1 = 0 \\ \bar{x} \geq 0 \end{cases}$$

Варіант 19

За допомогою диференційного алгоритму розв'язати задачу лінійного програмування:

$$y(\bar{x}) = 4x_1 - 2x_2 + x_3 + 19 \rightarrow \min_{\bar{x} \in \Omega}$$

$$\Omega: \begin{cases} -2x_1 - x_2 + x_3 - x_4 - 2 = 0 \\ -2x_1 - 3x_2 - x_3 - x_5 + 10 = 0 \\ \bar{x} \geq 0 \end{cases}$$

Варіант 20

За допомогою диференційного алгоритму розв'язати задачу лінійного програмування:

$$y(\bar{x}) = 4x_1 - 2x_2 + x_3 + 20 \rightarrow \min_{\bar{x} \in \Omega}$$

$$\Omega: \begin{cases} -x_1 - 3x_2 - x_3 - x_4 + 10 = 0 \\ -2x_1 - x_2 + x_3 - x_5 - 2 = 0 \\ \bar{x} \geq 0 \end{cases}$$

Варіант 21

За допомогою диференційного алгоритму розв'язати задачу лінійного програмування:

$$y(\bar{x}) = x_1 - 2x_2 + 4x_3 + 21 \rightarrow \min_{\bar{x} \in \Omega}$$

$$\Omega: \begin{cases} x_1 - x_2 - 2x_3 - x_4 - 4 = 0 \\ -x_1 - 3x_2 - x_3 - x_5 + 16 = 0 \\ \bar{x} \geq 0 \end{cases}$$

Варіант 22

За допомогою диференційного алгоритму розв'язати задачу лінійного програмування:

$$y(\bar{x}) = x_1 - 2x_2 + 4x_3 + 22 \rightarrow \min_{\bar{x} \in \Omega}$$

$$\Omega: \begin{cases} -x_1 - 3x_2 - x_3 - x_4 + 15 = 0 \\ x_1 - x_2 - 2x_3 - x_5 - 3 = 0 \\ \bar{x} \geq 0 \end{cases}$$

Варіант 23

За допомогою диференційного алгоритму розв'язати задачу лінійного програмування:

$$y(\bar{x}) = -2x_1 + x_2 + 4x_3 + 23 \rightarrow \min_{\bar{x} \in \Omega}$$

$$\Omega: \begin{cases} -x_1 + x_2 - 2x_3 - x_4 - 3 = 0 \\ -3x_1 - x_2 - x_3 - x_5 + 15 = 0 \\ \bar{x} \geq 0 \end{cases}$$

Варіант 24

За допомогою диференційного алгоритму розв'язати задачу лінійного програмування:

$$y(\bar{x}) = -2x_1 + x_2 + 4x_3 + 24 \rightarrow \min_{\bar{x} \in \Omega}$$

$$\Omega: \begin{cases} -3x_1 - x_2 - x_3 - x_4 + 16 = 0 \\ -x_1 + x_2 - 2x_3 - x_5 - 4 = 0 \\ \bar{x} \geq 0 \end{cases}$$

Варіант 25

За допомогою диференційного алгоритму розв'язати задачу лінійного програмування:

$$y(\bar{x}) = x_1 - 4x_2 + 5x_3 + 25 \rightarrow \min_{\bar{x} \in \Omega}$$

$$\Omega: \begin{cases} -x_1 + x_2 - x_3 - x_4 + 6 = 0 \\ x_1 - 3x_2 - 3x_3 - x_5 - 2 = 0 \\ \bar{x} \geq 0 \end{cases}$$

Варіант 26

За допомогою диференційного алгоритму розв'язати задачу лінійного програмування:

$$y(\bar{x}) = x_1 - 4x_2 + 2x_3 + 26 \rightarrow \min_{\bar{x} \in \Omega}$$

$$\Omega: \begin{cases} x_1 - 3x_2 - 3x_3 - x_4 - 2 = 0 \\ -x_1 + x_2 - 3x_3 - x_5 + 6 = 0 \\ \bar{x} \geq 0 \end{cases}$$

Варіант 27

За допомогою диференційного алгоритму розв'язати задачу лінійного програмування:

$$y(\bar{x}) = 3x_1 - x_2 + 8x_3 + 27 \rightarrow \min_{\bar{x} \in \Omega}$$

$$\Omega: \begin{cases} 2x_1 - x_2 - x_3 - x_4 + 4 = 0 \\ -x_1 + x_2 - 3x_3 - x_5 - 3 = 0 \\ \bar{x} \geq 0 \end{cases}$$

Варіант 28

За допомогою диференційного алгоритму розв'язати задачу лінійного програмування:

$$y(\bar{x}) = 2x_1 + 2x_2 - 3x_3 + 28 \rightarrow \min_{\bar{x} \in \Omega}$$

:

$$\Omega: \begin{cases} -x_1 + x_2 - x_3 - x_4 - 2 = 0 \\ -4x_1 - x_2 - x_5 + 5 = 0 \\ \bar{x} \geq 0 \end{cases}$$

Варіант 29

За допомогою диференційного алгоритму розв'язати задачу лінійного програмування:

$$y(\bar{x}) = -x_1 + 3x_2 + 7x_3 + 9 \rightarrow \min_{\bar{x} \in \Omega}$$

$$\Omega: \begin{cases} -x_1 - 2x_2 - x_3 - x_4 + 4 = 0 \\ x_1 - x_2 - 3x_3 - x_5 - 2 = 0 \\ \bar{x} \geq 0 \end{cases}$$

Варіант 30

За допомогою диференційного алгоритму розв'язати задачу лінійного програмування:

$$y(\bar{x}) = 3x_1 + 2x_2 - 5x_3 + 30 \rightarrow \min_{\bar{x} \in \Omega}$$

$$\Omega: \begin{cases} x_1 - 2x_2 - x_3 - x_4 - 1 = 0 \\ -3x_1 - 2x_2 - x_3 - x_5 + 5 = 0 \\ \bar{x} \geq 0 \end{cases}$$

Індивідуальні завдання з теми “Транспортна задача. Постановка, методи розв'язання та аналізу”

Постачальники $A_1, A_2, A_3, \dots, A_m$ мають запаси продукції в кількостях a_1, a_2, \dots, a_m т. відповідно. Споживачі $B_1, B_2, B_3, \dots, B_n$ повинні отримати цю продукцію в кількостях b_1, b_2, \dots, b_n т. відповідно. Знайти такий Варіант прикріплення постачальників до споживачів, при якому сума витрат на перевезення буде мінімальною. Якщо витрати по перевезенню 1 т. продукції задані в таблиці:

Варіант 1

$a_i \backslash b_j$	80	140	110
60	4	3	5
150	10	1	2
80	3	8	6
40	6	4	9

Варіант 2

$a_i \backslash b_j$	70	120	105	125	110
120	14	8	17	5	3
180	21	10	7	11	6
230	3	5	8	4	9

Варіант 3

$a_i \backslash b_j$	80	60	30	90
70	3	7	5	2
45	5	3	4	7
90	2	1	8	5
55	5	7	2	8

Варіант 4

$b_j \backslash a_i$	120	150	130
140	5	8	4
110	3	1	8
50	7	3	6
100	4	9	6

Варіант 5

$b_j \backslash a_i$	150	130	120
125	6	3	4
115	4	7	2
130	8	5	9
120	3	7	2

Варіант 6

$b_j \backslash a_i$	80	70	90	60	70
120	7	4	15	9	14
150	11	2	7	3	10
100	4	5	12	8	17

Варіант 7

$b_j \backslash a_i$	112	105	108
107	7	5	4
103	4	9	5
35	8	6	2
80	3	5	1

Варіант 8

$b_j \backslash a_i$	110	135	120
120	7	2	4
125	3	8	9
80	1	3	9
40	6	4	2

Варіант 9

$b_j \backslash a_i$	140	145	45
70	7	4	1
145	5	9	8
55	3	8	3
60	3	1	4

Варіант 10

$b_j \backslash a_i$	120	170	110
90	6	4	2
100	3	5	7
80	1	4	6
130	5	6	8

Варіант 11

$b_j \backslash a_i$	16	14	10
17	2	1	3
11	4	2	4
5	1	3	5
7	4	7	1

Варіант 12

$b_j \backslash a_i$	10	16	14
8	3	7	3
10	2	1	5
7	2	5	1
15	4	2	7

Варіант 13

$b_j \backslash a_i$	300	280	330	290	100
370	21	18	14	3	4
450	7	11	10	5	12
480	4	8	16	9	13

Варіант 14

$b_j \backslash a_i$	7	8	15	10
16	2	5	5	4
18	4	7	2	9
6	3	2	1	2

Варіант 15

$b_j \backslash a_i$	19	13	18
17	3	1	2
10	4	2	6
12	2	3	4
11	3	7	1

Варіант 16

$a_i \backslash b_j$	11	10	19
6	9	5	3
13	4	1	9
12	3	2	1
9	4	5	6

Варіант 17

$a_i \backslash b_j$	10	17	18
10	3	5	2
9	2	6	9
14	5	2	8
12	4	1	3

Варіант 18

$a_i \backslash b_j$	115	119	111
117	2	1	6
50	1	7	4
110	4	2	8
68	3	1	2

Варіант 19

$a_i \backslash b_j$	120	130	140
115	3	2	6
125	8	7	2
50	4	1	7
100	3	5	1

Варіант 20

$a_i \backslash b_j$	120	130	140
115	6	7	5
100	3	7	1
125	2	3	4
50	8	2	1

Варіант 21

$a_i \backslash b_j$	130	230	190	160	120
260	2	4	11	5	3
300	8	17	13	7	6
270	14	10	5	8	9

Варіант 22

$a_i \backslash b_j$	90	120	110	130	70
175	12	9	7	11	6
165	4	3	12	2	8
180	5	17	9	4	11

Варіант 23

$a_i \backslash b_j$	20	25	35	40
25	12	15	14	10
50	16	20	28	17
45	19	21	16	13

Варіант 24

$a_i \backslash b_j$	120	50	190	110
160	7	8	1	2
140	4	5	9	8
170	9	2	3	6

Варіант 25

$a_i \backslash b_j$	100	90	160	150	80
150	2	10	15	14	4
170	3	7	12	5	8
260	1	18	6	13	16

Варіант 26

$a_i \backslash b_j$	100	110	80	210
120	11	4	15	7
130	9	7	14	5
150	8	3	6	10

Варіант 27

$a_i \backslash b_j$	100	110	120	130
220	11	2	3	9
150	12	4	10	20
90	18	5	1	6

Варіант 28

$a_i \backslash b_j$	45	55	75	85
120	4	5	2	6
60	1	4	8	3
80	5	6	1	9

Варіант 29

$b_j \backslash a_i$	150	110	100	140
220	2	4	7	11
120	6	1	5	2
160	1	9	5	12

Варіант 30

$b_j \backslash a_i$	150	110	100	140
220	2	4	7	11
120	6	1	5	2
160	1	9	5	12

Індивідуальні завдання з теми “Теорія двоїстості”

Для виготовлення m видів продукції використовують n видів сировини. Запаси сировини, кількість одиниць сировини, що витрачаються на виготовлення одиниці продукції, а також величина прибутку, отримувана від реалізації одиниці продукції приведені в таблиці. Необхідно скласти такий план випуску продукції, щоб при її реалізації отримати максимальний прибуток.

1. Скласти план виробництва m видів продукції, щоб при її реалізації отримати максимальний прибуток.
2. За вихідними даними задачі сформулювати другу економічну задачу (двоїсту до даної).
3. Знайти оптимальне рішення двоїстої задачі.
4. Визначити дефіцитність сировини.

Варіант 1

Вид сировини	Кількість одиниць сировини, що йдуть на виготовлення одиниці виробу		Запас сировини
	I	II	
А	1	1	5
Б	2	3	6
В	3	1	3
Прибуток від реалізації одиниці продукції	7	2	

Варіант 2

Вид сировини	Кількість одиниць сировини, що йдуть на виготовлення одиниці виробу		Запас сировини
	I	II	
Б	5	1	3
В	3	1	3
Г	2	1	4
Прибуток від реалізації одиниці продукції	7	2	

Варіант 3

Вид сировини	Кількість одиниць сировини, що йдуть на виготовлення одиниці виробу		Запас сировини
	I	II	
A	1	1	6
Б	2	1	4
В	1	1	8
Прибуток від реалізації одиниці продукції	1	2	

Варіант 4

Вид сировини	Кількість одиниць сировини, що йдуть на виготовлення одиниці виробу		Запас сировини
	I	II	
A	2	1	4
Б	1	1	6
Г	3	1	18
Прибуток від реалізації одиниці продукції	3	2	

Варіант 5

Вид сировини	Кількість одиниць сировини, що йдуть на виготовлення одиниці виробу		Запас сировини
	I	II	
A	1	2	4
В	1	1	6
Г	2	1	8
Прибуток від реалізації одиниці продукції	2	3	

Варіант 6

Вид сировини	Кількість одиниць сировини, що йдуть на виготовлення одиниці виробу		Запас сировини
	I	II	
Б	1	3	6
В	1	1	3
Г	2	1	3
Прибуток від реалізації одиниці продукції	1	2	

Варіант 7

Вид сировини	Кількість одиниць сировини, що йдуть на виготовлення одиниці виробу		Запас сировини
	I	II	
A	2	1	3
В	1	2	5
Г	1	1	6
Прибуток від реалізації одиниці продукції	2	5	

Варіант 8

Вид сировини	Кількість одиниць сировини, що йдуть на виготовлення одиниці виробу		Запас сировини
	I	II	
A	1	2	4
B	2	3	10
Г	2	1	12
Прибуток від реалізації одиниці продукції	2	3	

Варіант 9

Вид сировини	Кількість одиниць сировини, що йдуть на виготовлення одиниці виробу		Запас сировини
	I	II	
A	1	1	8
Б	2	1	4
B	1	1	6
Прибуток від реалізації одиниці продукції	1	2	

Варіант 10

Вид сировини	Кількість одиниць сировини, що йдуть на виготовлення одиниці виробу		Запас сировини
	I	II	
Б	1	2	6
B	1	1	5
Г	1	1	6
Прибуток від реалізації одиниці продукції	2	1	

Варіант 11

Вид сировини	Кількість одиниць сировини, що йдуть на виготовлення одиниці виробу		Запас сировини
	I	II	
A	2	1	3
B	1	2	4
Г	1	1	6
Прибуток від реалізації одиниці продукції	2	3	

Варіант 12

Вид сировини	Кількість одиниць сировини, що йдуть на виготовлення одиниці виробу		Запас сировини
	I	II	
Б	2	1	4
B	1	1	6
Г	1	1	8
Прибуток від реалізації одиниці продукції	1	2	

Варіант 13

Вид сировини	Кількість одиниць сировини, що йдуть на виготовлення одиниці виробу		Запас сировини
	I	II	
А	1	1	3
Б	1	1	6
Г	2	1	4
Прибуток від реалізації одиниці продукції	3	2	

Варіант 14

Вид сировини	Кількість одиниць сировини, що йдуть на виготовлення одиниці виробу		Запас сировини
	I	II	
А	1	1	8
Б	2	1	6
В	1	2	4
Прибуток від реалізації одиниці продукції	2	2	

Варіант 15

Вид сировини	Кількість одиниць сировини, що йдуть на виготовлення одиниці виробу		Запас сировини
	I	II	
А	1	1	8
В	1	1	8
Г	2	3	10
Прибуток від реалізації одиниці продукції	2	2	

Варіант 16

Вид сировини	Кількість одиниць сировини, що йдуть на виготовлення одиниці виробу		Запас сировини
	I	II	
Б	1	1	6
В	1	2	4
Г	2	1	3
Прибуток від реалізації одиниці продукції	7	2	

Варіант 17

Вид сировини	Кількість одиниць сировини, що йдуть на виготовлення одиниці виробу		Запас сировини
	I	II	
Б	2	1	3
В	1	2	4
Г	1	1	6
Прибуток від реалізації одиниці продукції	2	3	

Варіант 18

Вид сировини	Кількість одиниць сировини, що йдуть на виготовлення одиниці виробу		Запас сировини
	I	II	
Б	1	1	3
В	1	1	6
Г	1	2	4
Прибуток від реалізації одиниці продукції	2	1	

Варіант 19

Вид сировини	Кількість одиниць сировини, що йдуть на виготовлення одиниці виробу		Запас сировини
	I	II	
А	1	2	3
Б	1	1	6
Г	2	1	4
Прибуток від реалізації одиниці продукції	3	2	

Варіант 20

Вид сировини	Кількість одиниць сировини, що йдуть на виготовлення одиниці виробу		Запас сировини
	I	II	
А	1	1	8
Б	1	1	6
Г	1	2	4
Прибуток від реалізації одиниці продукції	2	1	

Варіант 21

Вид сировини	Кількість одиниць сировини, що йдуть на виготовлення одиниці виробу		Запас сировини
	I	II	
А	1	1	8
Б	3	1	9
Г	1	2	4
Прибуток від реалізації одиниці продукції	2	5	

Варіант 22

Вид сировини	Кількість одиниць сировини, що йдуть на виготовлення одиниці виробу		Запас сировини
	I	II	
А	1	2	18
В	1	1	8
Г	0	1	6
Прибуток від реалізації одиниці продукції	3	2	

Варіант 23

Вид сировини	Кількість одиниць сировини, що йдуть на виготовлення одиниці виробу		Запас сировини
	I	II	
Б	1	1	3
В	5	3	27
Г	3	2	6
Прибуток від реалізації одиниці продукції	2	4	

Варіант 24

Вид сировини	Кількість одиниць сировини, що йдуть на виготовлення одиниці виробу		Запас сировини
	I	II	
А	2	1	4
Б	2	1	6
В	1	1	3
Прибуток від реалізації одиниці продукції	1	2	

Варіант 25

Вид сировини	Кількість одиниць сировини, що йдуть на виготовлення одиниці виробу		Запас сировини
	I	II	
Б	1	2	4
В	2	3	10
Г	2	1	3
Прибуток від реалізації одиниці продукції	2	3	

Варіант 26

Вид сировини	Кількість одиниць сировини, що йдуть на виготовлення одиниці виробу		Запас сировини
	I	II	
Б	2	1	3
В	1	2	5
Г	1	1	6
Прибуток від реалізації одиниці продукції	2	5	

Варіант 27

Вид сировини	Кількість одиниць сировини, що йдуть на виготовлення одиниці виробу		Запас сировини
	I	II	
А	1	1	1
Б	5	1	3
В	3	1	3
Г	2	1	4
Прибуток від реалізації одиниці продукції	7	2	

Варіант 28

Вид сировини	Кількість одиниць сировини, що йдуть на виготовлення одиниці виробу		Запас сировини
	I	II	
Б	1	1	6
В	2	1	4
Г	1	1	8
Прибуток від реалізації одиниці продукції	1	2	

Варіант 29

Вид сировини	Кількість одиниць сировини, що йдуть на виготовлення одиниці виробу		Запас сировини
	I	II	
Б	2	1	4
В	1	1	6
Г	1	2	12
Прибуток від реалізації одиниці продукції	3	2	

Варіант 30

Вид сировини	Кількість одиниць сировини, що йдуть на виготовлення одиниці виробу		Запас сировини
	I	II	
Б	1	1	6
В	1	2	4
Г	2	1	8
Прибуток від реалізації одиниці продукції	2	3	

Індивідуальні завдання з теми “Безумовна оптимізація. Класичні методи”

Варіант 1

Знайти мінімум функції методом Ейлера; $y(\bar{x}) = x_1^2 x_2 + \frac{x_1^2}{x_2} + \frac{4}{x_1} \rightarrow \min_{x \in R^2}$,

Варіант 2

Знайти мінімум функції методом Ейлера; $y(\bar{x}) = 3x_2 + \frac{2x_1}{x_2} + \frac{1}{x_1^2 x_2} \rightarrow \min_{x \in R^2}$,

Варіант 3

Знайти мінімум функції методом Ейлера; $y(\bar{x}) = 2x_1 x_2 + \frac{1}{x_1^2} + \frac{1}{x_2^2} \rightarrow \min_{x \in R^2}$,

Варіант 4

Знайти мінімум функції методом Ейлера; $y(\bar{x}) = x_1^3 + x_2^3 + \frac{3}{x_1 x_2} \rightarrow \min_{x \in R^2}$,

Варіант 5

Знайти мінімум функції методом Ейлера; $y(\bar{x}) = \frac{1}{4} x_1^2 x_2 + \frac{x_1^2}{x_2} + \frac{2}{x_1} \rightarrow \min_{x \in R^2}$,

Варіант 6

Знайти мінімум функції методом Ейлера; $y(\bar{x}) = 2\sqrt{x_1} + 3x_2 + \frac{1}{x_1 \cdot x_2^3} \rightarrow \min_{x \in R^2},$

Варіант 7

Знайти мінімум функції методом Ейлера; $y(\bar{x}) = 2x_1x_2 + \frac{3}{x_2} + \frac{27}{x_1^2x_2} \rightarrow \min_{x \in R^2},$

Варіант 8

Знайти мінімум функції методом Ейлера; $y(\bar{x}) = 2x_1 + \frac{2}{x_1\sqrt{x_2}} + x_2 \rightarrow \min_{x \in R^2},$

Варіант 9

Знайти мінімум функції методом Ейлера; $y(\bar{x}) = 3x_1^3 + 3x_2^3 + \frac{9}{x_1x_2} \rightarrow \min_{x \in R^2},$

Варіант 10

Знайти мінімум функції методом Ейлера; $y(\bar{x}) = 4x_2\sqrt{x_1} + \frac{4}{x_2} + \frac{4}{\sqrt{x_1}} \rightarrow \min_{x \in R^2},$

Варіант 11

Знайти мінімум функції методом Ейлера; $y(\bar{x}) = x_1x_2 + \frac{2}{x_1^4x_2^2} + \frac{2}{x_2^2} \rightarrow \min_{x \in R^2},$

Варіант 12

Знайти мінімум функції методом Ейлера; $y(\bar{x}) = 3 \cdot x_2 \cdot \sqrt[3]{x_1} + \frac{2}{x_2} + \frac{1}{x_1 \cdot x_2} \rightarrow \min_{x \in R^2},$

Варіант 13

Знайти мінімум функції методом Ейлера; $y(\bar{x}) = x_1x_2 + \frac{2}{x_2} + \frac{2}{x_1^2x_2} \rightarrow \min_{x \in R^2},$

Варіант 14

Знайти мінімум функції методом Ейлера; $y(\bar{x}) = x_1^2x_2 + \frac{4x_1^2}{x_2} + \frac{8}{x_1} \rightarrow \min_{x \in R^2},$

Варіант 15

Знайти мінімум функції методом Ейлера; $y(\bar{x}) = x_1 + \frac{2x_2}{\sqrt{x_1}} + \frac{2}{x_2} \rightarrow \min_{x \in R^2},$

Варіант 16

Знайти мінімум функції методом Ейлера; $y(\bar{x}) = \sqrt{x_1x_2} + \frac{9}{x_2} + \frac{36}{x_1} \rightarrow \min_{x \in R^2},$

Варіант 17

Знайти мінімум функції методом Ейлера; $y(\bar{x}) = \frac{2}{9}x_1x_2^4 + \frac{8}{x_1} + \frac{16}{3x_2} \rightarrow \min_{x \in R^2},$

Варіант 18

Знайти мінімум функції методом Ейлера; $y(\bar{x}) = x^2x_2 + \frac{3}{x_2} + \frac{2x_2}{x_1} \rightarrow \min_{x \in R^2},$

Варіант 19

Знайти мінімум функції методом Ейлера; $y(\bar{x}) = x_2 + \frac{2x_1}{\sqrt{x_2}} + \frac{2}{x_1} \rightarrow \min_{x \in R^2},$

Варіант 20

Знайти мінімум функції методом Ейлера; $y(\bar{x}) = x_2\sqrt{x_1} + \frac{4}{x_1x_2} + \frac{1}{x_2} \rightarrow \min_{x \in R^2},$

Варіант 21

Знайти мінімум функції методом Ейлера; $y(\bar{x}) = x_2\sqrt{x_1} + \frac{1}{2x_1} + \frac{8}{x_1x_2^4} \rightarrow \min_{x \in R^2},$

Варіант 22

Знайти мінімум функції методом Ейлера; $y(\bar{x}) = 2\sqrt{x_2} + \frac{x_1}{4x_2^2} + \frac{1}{x_1} \rightarrow \min_{x \in R^2},$

Варіант 23

Знайти мінімум функції методом Ейлера; $y(\bar{x}) = x_1x_2 + \frac{4}{x_2\sqrt{x_1}} + \frac{2}{\sqrt{x_1}} \rightarrow \min_{x \in R^2},$

Варіант 24

Знайти мінімум функції методом Ейлера; $y(\bar{x}) = 4\frac{x_2}{x_1^2} + x_1 + \frac{2}{\sqrt{x_2}} \rightarrow \min_{x \in R^2},$

Варіант 25

Знайти мінімум функції методом Ейлера; $y(\bar{x}) = 2\sqrt{x_1x_2} + \frac{1}{x_1} + \frac{16}{x_1x_2^2} \rightarrow \min_{x \in R^2},$

Варіант 26

Знайти мінімум функції методом Ейлера; $y(\bar{x}) = 4x_1x_2^2 + \frac{1}{x_2} + \frac{x_2^2}{x_1} \rightarrow \min_{x \in R^2},$

Варіант 27

Знайти мінімум функції методом Ейлера; $y(\bar{x}) = 4x_1^2x_2 + \frac{2}{\sqrt{x_2}} + \frac{1}{x_1} \rightarrow \min_{x \in R^2},$

Варіант 28

Знайти мінімум функції методом Ейлера; $y(\bar{x}) = x_1 + \frac{6}{x_1\sqrt{x_2}} + 9x_1x_2 \rightarrow \min_{x \in R^2},$

Варіант 29

Знайти мінімум функції методом Ейлера; $y(\bar{x}) = 2x_1x_2 + \frac{25}{x_1\sqrt{x_2}} + \frac{20}{\sqrt{x_2}} \rightarrow \min_{x \in R^2},$

Варіант 30

Знайти мінімум функції методом Ейлера; $y(\bar{x}) = 5x_1x_2 + \frac{1}{5x_2\sqrt{x_1}} + \frac{1}{\sqrt{x_1}} \rightarrow \min_{x \in R^2},$

Індивідуальні завдання з теми “Парнолінійна регресія”

Варіант 1

Досліджується лінійний зв'язок між відповідними показниками для 5 банків України. Побудувати лінійну регресійну модель, знайти оцінки її параметрів. Обчисліть коефіцієнти кореляції та детермінації.

Показники	Ощадбанк	Україна	Приватбанк	Укрсоцбанк	Аваль
Чисті активи(x)	10.27	18.45	11.25	10.04	8.38
Власні засоби(y)	7.85	21.33	7.62	11.35	3.93

Варіант 2

Показники	Пумб	Укрсіббанк	Славянський	Укркредбанк	Укрінбанк
Чисті активи(x)	4.93	1.51	1.36	1.37	2.02
Власні засоби(y)	3.89	3.29	2.59	0.98	1.67

Варіант 3

Показники	БГбанк	Правексбанк	Зевс	Металург	Стандарт
Чисті активи(x)	1.61	1.17	0.81	0.51	0.66
Власні засоби(y)	0.91	1.16	0.99	1.02	0.86

Варіант 4

Показники	Ощадбанк	Україна	Приватбанк	Укрсоцбанк	Аваль
Власні засоби(x)	7.85	21.33	7.62	11.35	3.93
Статутний фонд(y)	1.06	5.63	4.55	2.95	3.5

Варіант 5

Показники	Пумб	Укрсіббанк	Славянський	Укркредбанк	Укрінбанк
Власні засоби(x)	3.89	3.29	2.59	0.98	1.67
Статутний фонд(y)	2.04	9.08	1.68	0.69	1.53

Варіант 6

Показники	БГбанк	Правексбанк	Зевс	Металург	Стандарт
Власні засоби(x)	1.67	0.91	1.16	0.99	1.02
Статутний фонд(y)	1.53	2.25	2.48	1.78	1.18

Варіант 7

Показники	Ощадбанк	Україна	Приватбанк	Укрсоцбанк	Аваль
Статутний фонд(x)	1.06	5.63	4.55	2.95	3.5
Внески громадян(y)	51.1	12.16	14.155	4.5	1.5

Варіант 8

Показники	Пумб	Укрсіббанк	Славянський	Укркредбанк	Укрінбанк
Статутний фонд(x)	2.04	9.08	1.68	0.69	1.53
Внески громадян(y)	0.07	0.08	0.6	0.3	1.3

Варіант 9

Показники	БГбанк	Правексбанк	Зевс	Металург	Стандарт
Статутний фонд(x)	1.53	2.25	2.48	1.78	1.18
Внески громадян(y)	0.01	0.8	0.3	0.8	0.001

Варіант 10

Показники	Ощадбанк	Україна	Приватбанк	Укрсоцбанк	Аваль
Внески громадян(x)	51.1	12.16	14.155	4.5	1.5
Балансовий прибуток(y)	6.4	9.01	15.73	10.51	7.95

Варіант 11

Показники	Пумб	Укрсіббанк	Славянський	Укркредбанк	Укрінбанк
Внески громадян(x)	0.07	0.08	0.6	0.3	1.3
Балансовий прибуток(y)	4.76	1.08	7.06	3.83	0.63

Варіант 12

Показники	БГбанк	Правексбанк	Зевс	Металург	Стандарт
Внески громадян(x)	0.01	0.8	0.3	0.8	0.001
Балансовий прибуток(y)	1.47	0.55	1.83	1.8	1.31

Варіант 13

Показники	Ощадбанк	Україна	Приватбанк	Укрсоцбанк	Аваль
Балансовий прибуток(x)	6.4	9.01	15.73	10.51	7.95
Чисті активи(y)	10.27	18.45	11.25	10.04	8.38

Варіант 14

Показники	Пумб	Укрсіббанк	Славянський	Укркредбанк	Укрінбанк
Балансовий прибуток(x)	4.76	1.08	7.06	3.83	0.63
Чисті активи(y)	4.93	1.51	1.36	1.37	2.02

Варіант 15

Показники	БГбанк	Правексбанк	Зевс	Металург	Стандарт
Балансовий прибуток(x)	1.47	0.55	1.83	1.8	1.31
Чисті активи(y)	1.61	1.17	0.81	0.51	0.66

Варіант 16

Показники	Кредит	Надра	Вабанк	Югбанк	Енергобанк
Чисті активи(x)	0.7	1.45	1.22	0.64	0.68
Власні засоби(y)	1.15	0.88	1.02	0.7	0.84

Варіант 17

Показники	Фінкред	Кіббанк	Мтбанк	Укбанк	Кбанк
Чисті активи(x)	0.93	2.51	0.53	0.37	0.62
Власні засоби(y)	0.81	0.29	0.59	0.93	0.67

Варіант 18

Показники	Донгобанк	Псбанк	Югбанк	Метбанк	Стандарт
Чисті активи(x)	0.31	0.56	0.74	0.67	0.38
Власні засоби(y)	0.44	0.94	0.59	0.77	0.64

Варіант 19

Показники	Кредит	Надра	Вабанк	Югбанк	Енергобанк
Власні засоби(x)	1.15	0.88	1.02	0.7	0.84
Статутний фонд(y)	2.25	1.68	1.12	1.71	2.02

Варіант 20

Показники	Фінкред	Кіббанк	Мтбанк	Укбанк	Кбанк
Власні засоби(x)	0.81	0.29	0.59	0.93	0.67
Статутний фонд(y)	1.11	1.29	1.59	2.09	1.16

Варіант 21

Показники	Донгобанк	Псбанк	Югбанк	Метбанк	Стандарт
Власні засоби(x)	0.44	0.94	0.59	0.77	0.64
Статутний фонд(y)	1.24	0.64	0.79	0.71	1.22

Варіант 22

Показники	Кредит	Надра	Вабанк	Югбанк	Енергобанк
Статутний фонд(x)	2.25	1.68	1.12	1.71	2.02
Внески громадян(y)	0.35	0.58	0.32	0.71	0.57

Варіант 23

Показники	Фінкред	Кіббанк	Мтбанк	Укбанк	Кбанк
Статутний фонд(x)	1.11	1.29	1.59	2.09	1.16
Внески громадян(y)	0.36	0.09	0.03	0.09	0.51

Варіант 24

Показники	Донгобанк	Псбанк	Югбанк	Метбанк	Стандарт
Статутний фонд(x)	1.24	0.64	0.79	0.71	1.22
Внески громадян(y)	0.04	0.04	0.19	0.49	0.22

Варіант 25

Показники	Кредит	Надра	Вабанк	Югбанк	Енергобанк
Внески громадян(x)	0.35	0.58	0.32	0.71	0.57
Балансовий прибуток(y)	0.64	0.54	1.47	0.84	0.89

Варіант 26

Показники	Фінкред	Кіббанк	Мтбанк	Укбанк	Кбанк
Внески громадян(x)	0.04	0.04	0.19	0.49	0.22
Балансовий прибуток(y)	0.34	0.24	0.11	0.47	0.62

Варіант 27

Показники	Донгобанк	Псбанк	Югбанк	Метбанк	Стандарт
Внески громадян(x)	0.03	0.24	0.49	0.11	0.21
Балансовий прибуток(y)	1.64	1.04	0.93	0.48	0.75

Варіант 28

Показники	Кредит	Надра	Вабанк	Югбанк	Енергобанк
Балансовий прибуток(x)	0.64	0.54	1.47	0.84	0.89
Чисті активи(y)	0.7	1.45	1.22	0.64	0.68

Варіант 29

Показники	Фінкред	Кіббанк	Мтбанк	Укбанк	Кбанк
Балансовий прибуток(x)	0.44	0.94	1.37	0.94	0.99
Чисті активи(y)	0.93	2.51	0.53	0.37	0.62

Варіант 30

Показники	Донгобанк	Псбанк	Югбанк	Метбанк	Стандарт
Балансовий прибуток(x)	1.64	1.04	0.93	0.48	0.75
Чисті активи(y)	0.31	0.56	0.74	0.67	0.38

Індивідуальні завдання з теми “Лінійні моделі множинної регресії”

Варіант 1

Знайти невідомі параметри множинної лінійної регресії b_0 і b_1, b_2 .

x_1	2	4	6	7	8
x_2	20	15	12	19	33
y	75	86	95	88	72

Варіант 2

Знайти невідомі параметри множинної лінійної регресії b_0 і b_1, b_2 .

x_1	3	5	7	9	11
x_2	21	16	13	20	34
y	74	85	94	87	71

Варіант 3

Знайти невідомі параметри множинної лінійної регресії b_0 і b_1, b_2 .

x_1	5	7	9	11	13
x_2	20	17	12	11	30
y	76	86	92	88	78

Варіант 4

Знайти невідомі параметри множинної лінійної регресії b_0 і b_1, b_2 .

x_1	1	3	5	7	9
x_2	22	17	14	22	35
y	73	82	91	88	72

Варіант 5

Знайти невідомі параметри множинної лінійної регресії b_0 і b_1 .

x_1	2	3	4	5	6
x_2	30	25	22	29	43
y	85	96	95	98	82

Варіант 6

Знайти невідомі параметри множинної лінійної регресії b_0 і b_1, b_2 .

x_1	3	4	5	6	7
x_2	32	27	24	31	45
y	83	94	90	68	80

Варіант 7

Знайти невідомі параметри множинної лінійної регресії b_0 і b_1, b_2 .

x_1	4	5	6	8	2
x_2	28	25	22	29	43
y	81	94	89	94	82

Варіант 8

Знайти невідомі параметри множинної лінійної регресії b_0 і b_1, b_2 .

x_1	9	6	4	5	3
x_2	31	27	18	27	35
y	80	90	92	98	82

Варіант 9

Знайти невідомі параметри множинної лінійної регресії b_0 і b_1, b_2 .

x_1	8	7	3	4	3
x_2	21	17	12	29	33
y	75	86	95	88	72

Варіант 10

Знайти невідомі параметри множинної лінійної регресії b_0 і b_1, b_2 .

x_1	7	6	5	3	8
x_2	12	15	19	18	20
y	45	26	45	38	42

Варіант 11

Знайти невідомі параметри множинної лінійної регресії b_0 і b_1, b_2 .

x_1	1	3	4	6	2
x_2	8	15	19	18	10
y	35	26	55	38	42

Варіант 12

Знайти невідомі параметри множинної лінійної регресії b_0 і b_1, b_2 .

x_1	2	4	6	3	8
x_2	11	16	17	14	20
y	37	46	36	38	42

Варіант 13

Знайти невідомі параметри множинної лінійної регресії b_0 і b_1 .

x_1	1	2	3	4	7
x_2	17	18	12	19	24
y	45	24	45	36	42

Варіант 14

Знайти невідомі параметри множинної лінійної регресії b_0 і b_1, b_2 .

x_1	5	4	6	2	3
x_2	19	24	14	19	22
y	43	22	45	34	42

Варіант 15

Знайти невідомі параметри множинної лінійної регресії b_0 і b_1, b_2 .

x_1	2	1	3	5	7
x_2	18	14	15	17	16
y	41	28	45	32	42

Варіант 16

Знайти невідомі параметри множинної лінійної регресії b_0 і b_1, b_2 .

x_1	2	3	66	5	1
x_2	12	16	20	12	10
y	39	30	45	3	42

Варіант 17

Знайти невідомі параметри множинної лінійної регресії b_0 і b_1, b_2 .

x_1	6	1	2	4	5
x_2	29	11	13	18	33
y	65	76	85	78	62

Варіант 18

Знайти невідомі параметри множинної лінійної регресії b_0 і b_1, b_2 .

x_1	7	3	7	9	4
x_2	20	15	12	19	33
y	55	66	75	68	52

Варіант 19

Знайти невідомі параметри множинної лінійної регресії b_0 і b_1, b_2 .

x_1	3	5	7	9	8
x_2	20	35	43	19	33
y	45	56	65	58	72

Варіант 20

Знайти невідомі параметри множинної лінійної регресії b_0 і b_1, b_2 .

x_1	2	4	6	8	9
x_2	29	15	18	19	33
y	70	80	90	80	70

Варіант 21

Знайти невідомі параметри множинної лінійної регресії b_0 і b_1, b_2 .

x_1	3	5	9	12	14
x_2	20	45	42	39	33
y	75	86	95	88	72

Варіант 22

Знайти невідомі параметри множинної лінійної регресії b_0 і b_1, b_2 .

x_1	3	6	4	11	12
x_2	20	15	12	19	33
y	75	86	95	88	72

Варіант 23

Знайти невідомі параметри множинної лінійної регресії b_0 і b_1, b_2 .

x_1	5	8	12	13	14
x_2	28	45	29	19	30
y	75	86	95	88	72

Варіант 24

Знайти невідомі параметри множинної лінійної регресії b_0 і b_1, b_2 .

x_1	11	9	5	8	12
x_2	29	17	32	19	23
y	70	86	90	85	74

Варіант 25

Знайти невідомі параметри множинної лінійної регресії b_0 і b_1, b_2 .

x_1	11	12	13	17	18
x_2	32	35	22	29	33
y	75	86	95	88	72

Варіант 26

Знайти невідомі параметри множинної лінійної регресії b_0 і b_1, b_2 .

x_1	14	11	11	9	12
x_2	21	35	42	39	33
y	75	80	91	82	72

Варіант 27

Знайти невідомі параметри множинної лінійної регресії b_0 і b_1, b_2 .

x_1	3	5	7	18	11
x_2	23	18	13	29	33
y	65	86	95	88	72

Варіант 28

Знайти невідомі параметри множинної лінійної регресії b_0 і b_1, b_2 .

x_1	12	2	5	7	11
x_2	22	15	12	19	33
y	75	86	95	88	72

Варіант 29

Знайти невідомі параметри множинної лінійної регресії b_0 і b_1, b_2 .

x_1	11	12	13	7	8
x_2	40	27	35	21	33
y	75	86	95	88	72

Варіант 30

Знайти невідомі параметри множинної лінійної регресії b_0 і b_1, b_2 .

x_1	11	12	12	7	8
x_2	26	19	21	19	33
y	75	86	95	88	72

Список джерел

1. Самойленко М.І. Математичне програмування. – Харків: Основа, 2002. – 424с.
2. Зайченко Ю.П. Исследование операций: Учеб. пособие для студентов вузов. – Киев: Вища школа., 1989, – 392с.
3. Кузнецов Ю.Н., Кузубов В.И., Волощенко А.В. Математическое программирование. –М.: Высш.шк., 1980.
4. Бережная Е.В. Математические методы моделирования экономических систем. – М.: Финансы и статистика, 2001.
5. Красс М.С., Чупрынов Б.П. Математические методы и модели для магистрантов экономики: Учебное пособие. – СПб.: Питер, 2006. – 496с.:ил.
6. Лагоша Б.А. Оптимальное управление в экономике.. – М.: Финансы и статистика, 2003.
7. Долгопьятов Т.Г., Суворов Б.Г. Математическое моделирование экономических процессов МГУ, 1990, – 262с.
8. Зайченко Ю.П., Шумилова С.А. Исследование операций. Сборник задач. К. :Вища школа. - 1990. – 239с.
9. Плис А.И., Сливина Н.А. Математический практикум для экономистов и инженеров: Учебное пособие. – М.: Финансы и статистика, 1999.
10. Монахов А.В. Математические методы анализа экономики. СПб.: Питер, 2002. – 176с.
11. Конюховский П.В. Математические методы исследования операций в экономике. СПб.: Питер, 2002.
12. Жиронкина Г. В., Тіманюк В.О. Економетрія: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закладів.- Х.:Вид-во НФаУ: Золоті сторінки, 2004. – 224с.
13. Елисеева И. И. Эконометрика: Учебник.- М.:Финансы и статистика, 2003.
14. Лук'яненко І.Г. Городніченко Ю.О. Сучасні економетричні методи у фінансах. Навчальний посібник. – К.: Літера, ЛТД, 2002. – 352с.
15. Лук'яненко І.Г. Краснікова Л.І. Економетрика: Підручник. – К.: Товариство «Знання», КОО, 1998. – 494 с.
16. Черкасов В.В. Деловой риск предпринимательской деятельности: Практ. пособие.–Киев,1996.
17. Егоршин А.А., Малярец Л.М. Практикум по эконометрии в Excel: Учебное пособие для экономических вузов. – Х.: «ИНЖЕК», 2005. – 100с. Русск. Яз.
18. Самойленко М.І., Білогурова Г.В., Штельма О.М., Гавриленко І.О. Методичні вказівки до самостійного вирішення задач та виконання розрахункових завдань з курсу “Математичного програмування”. ХДАМГ, - 2006.

ЗМІСТ

	Стор.
Оптимізаційні економіко-математичні моделі	3
Побудова математичних моделей економічних задач.....	3
Лінійне програмування.....	7
Математична постановка задачі лінійного програмування	7
Форми запису задачі лінійного програмування	7
Розв'язання ЗЛП графічним методом в Excel.....	12
Застосування симплекс-методу в економічних задачах.....	15
Розв'язання ЗЛП диференційним алгоритмом та за допомогою засобу "Пошук рішення" MS Excel.....	18
Транспортна задача.	22
Постановка, методи розв'язання та аналізу	22
Розв'язання транспортної задачі за допомогою засобу "Пошук рішення" MS Excel.....	33
Двоїстість у лінійному програмуванні.....	35
Застосування теорії двоїстості в економіці	38
Нелінійні оптимізаційні моделі економічних систем	41
Безумовна оптимізація.....	41
Багатовимірні оптимізаційні задачі з обмеженнями у вигляді рівностей.	45
Застосування методу Лагранжа в економіці	46
Принципи побудови економетричних моделей. Парнолінійна регресія.....	47
Оцінка параметрів лінійної регресії за допомогою методу найменших квадратів	48
Лінійні моделі множинної регресії.....	52
Індивідуальні завдання з теми "Лінійне програмування: симплекс-метод"	54
Індивідуальні завдання з теми "Лінійне програмування: диференційний алгоритм"	60
Індивідуальні завдання з теми "Транспортна задача. Постановка, методи розв'язання та аналізу"	66
Індивідуальні завдання з теми "Теорія двоїстості"	71
Індивідуальні завдання з теми "Безумовна оптимізація. Класичні методи"	77
Індивідуальні завдання з теми "Парнолінійна регресія"	80
Індивідуальні завдання з теми "Лінійні моделі множинної регресії"	82
Список джерел.....	86

Навчальне видання

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

**до самостійної роботи, проведення практичних занять
і виконання розрахунково-графічної роботи**

з дисципліни

«ЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ»

*(для студентів 2 курсу денної та заочної форм навчання
освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр за напрямом
підготовки 6.030601 «Менеджмент»)*

Укладачі: **ШТЕЛЬМА** Ольга Миколаївна,
БЛОГУРОВА Ганна Вікторівна,
ДЯДІОН Сергій Васильович

Відповідальний за випуск *М. І. Самойленко*

За авторською редакцією

Комп'ютерний набір *О. М. Штельма*

Комп'ютерне верстання *Н. В. Зражевська*

План 2013, поз. 378М

Підп. до друку 28.03.2013

Формат 60×84/16

Друк на ризографі.

Ум. друк. арк. 5,1

Зам. №

Тираж 50 пр.

Видавець і виготовлювач:

Харківський національний університет
міського господарства імені О. М. Бекетова
вул. Революції, 12, Харків, 61002

Електронна адреса: rectorat@ksame.kharkov.ua

Свідоцтво суб'єкта видавничої справи:

ДК № 4064 від 12.05.2011 р.